

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af Vertimec (1-192) i raps i væksthus (Forædling)

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Grøn Plantebeskyttelse ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle arter og sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## Vejledning for Vertimec (1-192) i raps i væksthud (forædling)

### Skadedyrsmiddel:

- Må kun anvendes til bekæmpelse af trips, mellus, minérfluer og bladlus i raps i væksthud (forædling)
- Max. 5 behandlinger pr. kultur/afgrøde
- Frøene og planterne må ikke anvendes til konsum eller foder

### Advarsel:

”Se Vertimec etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## Brugsanvisning for Vertimec i raps i væksthud (forædling)

Skadegører: Trips, mellus, minérfluer og bladlus

### Dosering:

|                |            |
|----------------|------------|
| Vertimec       | Dosis l/ha |
| Pr. behandling | Max. 1,2   |

### Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Vertimec anvendes ved begyndende angreb.

På grund af risiko for resistens anbefales det at skifte mellem midler med forskellig virkemekanisme.

Antal behandlinger: Max. 5 behandlinger pr. kultur/afgrøde

09. oktober 2014