

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Vacciplant (740-1) i æbler og pærer mod skurv og gloeosporiumrød

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for mindre anvendelse af Vacciplant (740-1) i æbler og pærer mod skurv og gloeosporiumråd

Svampemiddel:

- Må kun anvendes i æbler og pærer til behandling af skurv og gloeosporiumråd.
- Max 20 behandlinger pr. sæson.

Advarsel:

”Se Vacciplant etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for mindre anvendelse af Vacciplant i æbler og pærer mod skurv og gloeosporiumråd

Anvendelse:

Skadegører	Dosering	Tidspunkt
Skurv	1,0 l/ha	Anvendes forebyggende mod sekundære infektioner med 10-20 dages mellemrum, afhængigt af smitterisikoen – jf. varslinger. Ved konventionel dyrkning anvendes et specifikt skurvmiddel ved højriskoforhold.
Gloeosporium råd	1,0 l/ha	Anvendes med 7-10 dages interval 3 uger før høst. Ved konventionel dyrkning kan suppleres med et specifikt middel mod lagersygdomme.

Sprøjteteknik: Udbringes typisk med luftassisteret frugttræsprøjte. Det er vigtigt med god fordeling på bladene. Vandmængde 200-500 l. Kan blandes med relevante svampe- og insektmidler.

Antal behandlinger: Op til 20 behandlinger i alt pr. sæson.

Risiko for skade: Der er ikke rapporteret skade på planter i forsøg og praksis.

14. oktober 2016