

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Zypar (64-88) i engrapgræs til bortsprøjtning af hvidkløver

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da SEGES PlanteInnovation udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan SEGES PlanteInnovation ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Zypar (64-88) i engrapgræs til bortsprøjtning af hvidkløver.

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i engrapgræs til bortsprøjtning af genvækst af hvidkløver efter høst af hvidkløver
- Halmen og rester må ikke opfodres
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter
- Brugsanvisningens angivelse af dosering og antal behandlinger skal overholdes.

Advarsel:

["Se Zypar etiketten"](#).

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning

Skadegører: Bortsprøjtning af genvækst af hvidkløver

Dosering:

Zypar	Dosis L/ha
1 sprøjtning	1,0 eller splitsprøjtning 2 x 0,5

Sprøjtetidspunkt: Der behandles i august måned så snart der efter høst er vækst i kløveren.

Antal behandlinger: Max. 1 sprøjtning med fuld dosis eller 2 sprøjtninger med 1/2 dosis

Risiko for skade: For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

21. februar 2018