

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Callisto (1-185) i elefantgræs

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Dansk Landbrug Sydhavsøerne kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Callisto (1-185) i elefantgræs

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i elefantgræs til behandling af tokimbladet ukrudt.
- Halm og planterester må ikke bruges til opfodring.
- Der må maksimalt foretages én behandling pr. sæson.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Advarsel

"Se [etiketten for Callisto](#)".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Godkendelse til mindre anvendelse skal forefindes i eller ved kemikalierummet.

Brugsanvisning for Callisto (1-185) i elefantgræs

Skadegører

Tokimbladet ukrudt

Dosering

Callisto	Dosis l/ha
Sprøjtning	1,0

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr

Alm. marksprøjte, 120-200 l vand/ha, medium dråbestørrelse når ukrudtet er i vækst.

Optimale virkningsforhold

- 1-2 timers tørvej
- Høj lysintensitet
- Gode vækstbetingelser

Antal behandlinger

Maksimalt 1 behandling pr. sæson.

26. juni 2014

Dansk Landbrug Sydhavsøerne
Agrovej 1
4800 Nykøbing F.