

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium 36 CS (421-2) i gulerødder efter fremspiring

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. FMC Chemicals spril kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Centium 36 CS (421-2) i gulerødder efter fremspiring

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i gulerødder til bekæmpelse af ukrudt, herunder specifikt sort natskygge, hanekro og hundepersille.
- Centium 36 CS anvendes efter fremspiring dog senest på 3 bladstadiet
- Max. 3 behandlinger med Centium 36 CS eller et andet clomazonholdigt produkt
- Command CS eller et andet clomazonholdigt produkt må kun anvendes hvert 3. år på samme areal
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

”Se Centium 36 CS etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Centium 36 CS i gulerødder efter fremspiring

Skadegører: Ukrudt - se etiketten mht. effekt overfor de enkelte ukrudtsarter

Dosering:

Centium 36 CS	Dosis L/ha*
1. sprøjtning	0,05-0,09
2. sprøjtning	0,05-0,09
3. sprøjtning	0,05-0,09

*Maksimalt 0,25 L/ha Centium 36 CS eller andet clomazon produkt pr. afgrøde

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Centium 36 CS anvendes efter fremspiring dog senest på 3 bladstadiet. Bedst effekt opnås ved god jordfugtighed og et veltilberedt såbed uden knolde.

Antal behandlinger:

Max. 3 behandlinger med Centium 36 CS eller et andet clomazonholdigt produkt

Risiko for skade:

Centium 36 CS kan under uheldige vejræssige forhold skade gulerødderne. Skader ses som forbigående hvidfarvning af bladene. Risikoen for at gulerøddernes vækst også hæmmes er størst, hvis skaden sker på kimbladsstadiet. Gulerødderne tåler bedre Centium 36 CS, når de har sat de første løvblade.

Dato: 06. februar 2017