

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Centium 36 CS i bederoer til foder og konsum**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)*

## **Ansvar for vejledning til mindre anvendelse**

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

## **Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar**

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

## Vejledning for Centium 36 CS i bederoer

### Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i bederoer
- Må ikke anvendes nærmere end 2 m. fra vandmiljøet (vandløb, søer m.m.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Må ikke anvendes senere end 3 dage før fremspring.
- Produktet eller andre produkter der indeholder clomazon må maksimalt anvendes hvert 3. år på arealet.

### Advarsel

"Se [Centium 36 CS](#) etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## Brugsanvisning for Centium 36 CS i bederoer

### Bekæmpelse

Centium 36 CS anvendes før fremspring af roerne som første led i et sprøjteprogram med flere sprøjtninger. Centium 36 CS anvendes med henblik på at opnå tilstrækkelig effekt mod hundepersille og en supplerende effekt mod burrenerre. Centium 36 CS har også effekt mod fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske.

### Dosering

Der anvendes 0,20 liter Centium 36 CS pr. ha senest 3 dage før fremspiring af roerne.

### Risiko for skade

For at mindske risikoen for skade skal roefrøene være sået i ensartet dybde.

Ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjtning og omkring fremspiring er der risiko for, at Centium 36 CS kan medføre skader på afgrøden.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

### Bemærkninger

#### Bemærkning fra firma

Ingen bemærkninger.

#### Bemærkning fra firma

Ingen bemærkninger.

#### Bemærkning fra Videncentret for Landbrug

Ingen bemærkninger.

*Kilde: Miljøministeriet*

Dato: 26. februar 2014