

# **Brugsanvisning til mindre anvendelse af Clomate (756-1) mod ukrudt i vår- og vinterhestebønner til produktion af udsæd og foder**

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel  
51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da SEGES PlanteInnovation udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan SEGES PlanteInnovation ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

# Vejledning for Clomate (756-1) mod ukrudt i vår- og vinterhestebønner til produktion af udsæd og foder

## Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår-og vinterhestebønner til produktion af udsæd og foder.
- Halm må ikke bruges til opfodring.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger og sprøjtetidspunkt.
- For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes hvert 3. år på samme areal. Der må endvidere i samme periode ikke også anvendes andre produkter, der indeholder clomazon.
- Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3 områder for at beskytte vilde planter.

## Advarsel

”Se Clomate etiketten”.

## Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger	Behandlings-tidspunkt	Sprøjtfrist/ PHI
Vår-og vinterhestebønner til produktion af udsæd og foder	Ukrudt	0,15-0,25 l/ha	1 gang pr vækstår.  Må max. anvendes hvert 3. år på samme areal	Forår ved etablering. Senest 3 dage efter såning	Ikke relevant

### Bekæmpelse:

Clomate har god effekt på burrester, fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske.

*Risiko for skade:* For at mindske risikoen for skade skal frøene af hestebønnerne være dækket af jord.

Ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjtning og omkring fremspiring er der risiko for, at Clomate kan medføre skader på afgrøden.

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Dato: 27. marts 2020