

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Command CS (19-109), Centium 36 CS (421-2) og Clomate (756-1) i spinat til frøavl

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. SEGES PlantelInnovation kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning for Command CS (19-109), Centium 36 CS (421-2) og Clomate (756-1) i spinat til frøavl

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes mod ukrudt i spinat til frøavl.
- Halm må ikke bruges til opfodring.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 m. fra vandmiljøet (vandløb, søer m.m.) for at beskytte organismer der lever i vand.
- Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3 områder for at beskytte vilde planter.
- For at beskytte grundvandet må midlet eller andre midler der indeholder clomazon, maksimalt anvendes hvert 3. år på samme areal.

Advarsel

"Se Command CS, Centium 36 CS eller Clomate etiketten".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Command CS, Centium 36 CS og Clomate i spinat til frøavl

Bekæmpelse

Command CS, Centium 36 CS og Clomate har god effekt på burresnerre, fuglegræs og hyrdetaske.

Dosering

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger*	Behandlingstidspunkt
Spinat	Ukrudt	0,25 L/ha	Max 1 gang hvert 3. år på samme areal	Efter såning og senest 3-5 dage før spinaten spirer frem

*) Midlerne eller andre midler der indeholder clomazon må maksimalt anvendes hvert 3. år på arealet.

Command CS, Centium 36 CS og Clomate kan anvendes ved udlæg af spinat om efteråret og om foråret.

Risiko for skade

For at mindske risikoen for skade skal spinaten sås i 2-2,5 centimeters dybde og frøene skal dækkes.

Ved store nedbørsmængder og forholdsvis koldt vejr efter sprøjtning og omkring fremspiring er der risiko for, at midlerne kan medføre skader på spinaten. Disse skader vil oftes forværres af efterfølgende Betanal/Betanal Classic/Herbasan sprøjtning.

For at tilpasse vejledning til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Dato: 23. oktober 2019