

# Brugsanvisning til mindre anvendelse af DFF (18-416), Legacy 500 SC (396-26), Diflanil 500 SC (601-1) og Sempra 500 SC (501-21) i purløg til frøproduktion

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

## **Ansvar for mindre anvendelse og vejledning**

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

### *Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar*

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. SEGES PlanteInnovation kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

## **Vejledning for DFF, Legacy 500 SC, Diflanil 500 SC og Sempra 500 SC i purløg til frøproduktion**

### **Ukrudtsmiddel**

- Må kun anvendes i purløg til frøproduktion
- Halm og andre rester må ikke opfodres
- Diflufenican holdige midler må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson
- Midlerne må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Efterfølgende afgrøder må tidligst etableres 12 uger efter behandling med et af midlerne

### **Advarsel**

"Se midlernes etikette".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

## **Brugsanvisning for DFF, Legacy 500 SC, Diflanil 500 SC og Sempra 500 SC i purløg til frøproduktion**

### **Bekæmpelse**

Bredbladet ukrudt

### **Dosering**

Op til 0,12 l/ha DFF, Legacy 500 SC, Diflanil 500 SC eller Sempra 500 SC

### **Tidspunkt for behandling**

Der behandles efterår/ vinteren i perioden oktober – februar

### **Risiko for skade**

For at mindske risikoen for skade skal vejledningen tilpasses den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold og eventuelt aftales med den lokale frøkonsulent

Dato: 25. juli 2019