

Brugsanvisning til mindre anvendelse og vejledning i brug af DFF (18- 416), Legacy 500 SC (396-26), Diflanil 500 SC (601-1) og Sempra (594-4) i frøgræs

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til
Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af
plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)*

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan Dansk Landbrugsrådgivning, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for DFF, Legacy 500 SC, Diflanil 500 SC og Sempra til bekæmpelse af ukrudt i frøgræs

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i frøgræs.
- Halm og andre rester må ikke opfodres.
- Diflufenican-holdige midler må kun anvendes 1 gang pr. vækstsæson.
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Advarsel

"Se [DFF](#), [Legacy 500 SC](#), [Diflanil 500 SC](#) og [Sempra](#) etikette".

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for DFF, Legacy 500 SC, Diflanil 500 SC og Sempra til bekæmpelse af ukrudt i frøgræs

Bekæmpelse

DFF/Legacy/Diflanil /Sempra kan anvendes alene eller i blanding med Oxitril. Hvor der ikke blandes med Oxitril bør der tilsættes sprede/klæbemiddel.

DFF har god effekt på blandt andet agerstedmoder, ærenpris og tvetand.

Dosering

Efter høst af dæksæd eller om foråret i etableret frøgræs anvendes 0,07-0,10 l

DFF/Legacy/Diflanil/ Sempra pr. ha i de småfrøede arter og 0,07-0,15 l i de storfrøede arter.

Højeste dosis anvendes, hvor der er en massiv forekomst af ukrudt, og hvor ukrudtsplanterne er store.

I rajgræs udlagt i renbestand om efteråret anvendes 0,15 l/ha på fugtig jord før afgrødens fremspiring. Denne behandling har effekt på enårig rapgræs. Det er afgørende for skånsomheden overfor kulturgræsset at rajgræsfrøet er dækket af min. 1. cm jord.

Risiko for skade

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Kilde: Miljøministeriet

Dato: 18.november 2014