

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Fenix (18-417) mod ukrudt i kartofler efter fremspiring på arealer med behov for opfølgende sprøjtning fx hvis kammen er skyllet ned

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da SEGES PlanteInnovation udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan SEGES PlanteInnovation ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Fenix (18-417) til bekæmpelse af ukrudt i industri og konsum kartofler efter fremspiring

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes mod ukrudt i kartofler efter fremspiring på arealer hvor der er behov for opfølgende sprøjtning fx hvis kammen er skyllet ned, og nyt ukrudt er spiret frem.
- Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval og sprøjtetidspunkt skal overholdes
- Dosering for denne mindre anvendelse og den samlede dosis på 2,5 L/ha pr. vækstår skal overholdes
- Sprøjteførere skal anvende handsker ved blanding og påfyldning.
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra § 3-områder, for at beskytte vilde planter
- Må i kartofler ikke anvendes senere end 40 dage før høst.

Advarsel:

”Se Fenix etiketten”.

Brugsanvisning

Til anvendelse på friland

Afgrøde	Skadevolder	Dosering pr. behandling	Antal behandlinger (interval)	Vandmængde	Behandlings-tidspunkt (vækststadier)
Kartofler	Tokimbladet ukrudt	1.behandling 0,25 L/ ha 2. behandling 0,25 L/ha I alt max. 2,5 L/ha pr. år på samme areal*	2 (mindst 7 dage)	100-300 L/ha	1.behandling: ca. 7-10 dage efter fremspiring 2.behandling: ca. 7-10 dage efter 1. behandling efter fremspiring

* Der må maksimalt være anvendt 2 L/ha før fremspiring

Sprøjteteknik: Marksprøjte (bomsprøjte)

Risiko for skade: Fenix efter fremspiring giver lidt bladsvindinger, som dog kun medfører en beskeden risiko for negativ påvirkning af udbyttet. Fenix bør ikke anvendes i læggekartofler efter fremspiring.

Dato: 4. april 2020