

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Folicur EW 250 (18-588) mod svampesygdomme i frøgræs BBCH 14-30 om efteråret

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til
Europaparlamentets og Rådets forordning [\(EF\) NR. 1107/2009 om markedsføring af
plantebeskyttelsesmidler artikel 51](#)*

Ansvar for vejledning til mindre anvendelse

Godkendelse i henhold til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da SEGES Plante & Miljø udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan SEGES Plante & Miljø ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning for Folicur EW 250 mod svampesygdomme i frøgræs BBCH om efteråret

Svampemiddel

- Må kun anvendes i frøgræs om efteråret i stadie 14 (4 blad udfoldet) – 30 (beg. strækning)
- Behandlet frøgræs må ikke anvendes til afgræsning. Halm fra frøgræs må tidligst anvendes til foder året efter behandling.
- Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
- Maksimal dosering ved efterårsanvendelse er 0,7 L/ha. Hvis der er sprøjtet om efteråret i frøgræs skal doseringen ved sprøjtning i forår/sommer-perioden nedsættes så der maksimalt anvendes 0,7 L/ha (svarende til 175 g tebuconazol/ha) i samme vækstår.
- Der må i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol, eller difenconazol med mindre doseringen nedsættes tilsvarende. Hvis der anvendes flere produkter med disse stoffer, skal doseringerne beregnes forholdsmæssigt ud fra aktivstoffernes respektive maksimale doser i de pågældende afgrøder eller afgrødestadier, jf. brugsanvisningerne.

Advarsel

"Se midlets etikette: [Folicur EW 250](#).

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Folicur EW 250 mod svampesygdomme i frøgræs BBCH 14-30 om efteråret

Bekæmpelse

Svampesygdomme i frøgræs.

Dosering

Folicur EW 250: Der anvendes 0,70 l/ha ved konstateret angreb i stadie 14-30 efterår.

Den maximale dosering på 0,70 l/ha kan splittes i 2 behandlinger.

Hvis der behandles både efterår og forår, må den samlede dosering i vækstsæsonen ikke overstige 0,7 l/ha

Risiko for skade

For at tilpasse vejledningen til den enkelte sort og de lokale dyrkningsforhold, bør den endelige vejledning for midlets anvendelse udarbejdes i samarbejde med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med.

Dato: 3. november 2016