



MCPA

Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma

Metaxon, reg.nr. 347-5, 10 l, Nufarm Deutschland GmbH
U46 M, reg.nr. 347-7, 5 og 10 l, Nufarm Deutschland GmbH

Metaxon U46M

Aktivstof g/kg-l
MCPA 750 g/l

Virkningsklasse
HRAC O

Faresymboler



Bimærke
Intet

Faresætninger

Farlig ved indtagelse.
Forårsager alvorlig øjenskade.

Godkendelse

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn.

Behandlingsfrist

Må kun anvendes én gang om året. Må ikke anvendes senere end afgrødens vækststadiet 39.

Forbehold

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet. Max en behandling pr. sæson.

Virkemåde

MCPA optages primært gennem bladene og transporteres rundt i hele planten herunder også ud i udløberne på flerårige ukrudtsarter som agertidsel og agerpadderokke. MCPA har auxinvirkning og forårsager ukontrolleret vækst i følsomme planter. Der kan ske rodoptagelse af MCPA og midlet har en vis persistens i jord. Det betyder, at der i en periode efter behandling af et areal ikke kan sås følsomme afgrøder som eksempelvis roer og raps.

Optimale virkningsforhold

	Minimum	Optimum	Maksimum
Temperatur	12 °C	20 °C	25 °C
Luftfugtighed	60 %	70-90 %	
Timer tørvejr	2-3	4-6	
Andet			
Ukrudt i god vækst og gode temperaturforhold omkring sprøjtetidspunktet.			

Brugsanvisning Metaxon og U46 M

Afgrøde	Skadegorer	Dosis l/ha	Tidspunkt og bemærkninger
Korn	Agerkål, agerpad-derok, agersennep, agersvinemælk, agertidsel, alm. pengeurt, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kiddike, kornblomst, kornvalmue, svinemælde	1,0	Afgrødens vækststadiet 20-39. Må kun anvendes én gang om året. Må ikke anvendes senere end 1. august.
Hvidkløver til frø (Mindre anvendelse)	Bortsprøjtning af hvidkløver	1,0	3 dage før forventet skårlægningstidspunkt
Planteskolekulturer, træfrugt (æble, pære, kirsebær og blomme) og buskfrugt (solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben) (Mindre anvendelse)	Tokimbladet ukrudt	1,0	Afskærmet sprøjtning. Må kun anvendes 1 gang om året og ikke efter 1. august.
Kartofler (Mindre anvendelse)	Ukrudt (primært hvidmelet gåsefod)	0,03-0,1	Der må max anvendes 0,1 l MCPA-middel pr. ha. Må ikke anvendes senere end vækststadiet 25, dvs. under dannelse af sideskud. Må kun anvendes 1 gang om året og ikke efter 1. august. Der er 3 måneders sprøjtfrist.



MCPA (fortsat)

Brugsanvisning Metaxon og U46 M (fortsat)

Afgrøde	Skadegører	Dosis l/ha	Tidspunkt og bemærkninger
Engrapgræs til frøavl (Mindre anvendelse)	Bortsprøjtning af hvidkløver	1,0	Der behandles så snart der efter høst igen er vækst i kløveren. Ikke senere end 1. september. Må kun anvendes en gang pr. vækstsæson
Nordmannsgran til juletræer og pyntegrønt (Mindre anvendelse)	Agerpadderok, agersnerle m.fl.	1,0	Afskærmet sprøjtning. Kun 1 gang om året og ikke efter 1. august
Jernbaner (Mindre anvendelse Metaxon og U46M)	Agerpadderok	0,8	