

FORSIGTIG

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovlige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning. I bederoer, rødbeder og rosenkål må maksimalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i brugsanvisningen. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2½ måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før høst. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

BRUGSANVISNING

Anvendelse

AAA Clo er velegnet til bekæmpelse af bredbladede ukrudtsarter i roer og vinterraps samt til pletsprøjtning i skovkulturer. AAA Clo optages primært gennem bladene.

Dosering

Bedste effekt af AAA Clo opnås når ukrudtet er i god vækst, og temperatur over 15°C. Det frarådes at sprøjte, under ekstremt høje temperaturer.

Afgrøder	Dosering	Tidspunkt
Bederoer, rødbeder Rosenkål(*) (**)	Max 0,25 l/ha	Forår sammen med andre produkter
Vinterraps (*)	0,80 l/ha	Forår planter i god vækst temp. 10-12°C
Skovkulturer (***)	1,50 l/ha	Om foråret

(*) Der kun må behandles hvert 4. år

(**) Må kun bånd- eller pletsprøjtes

(***) Må kun pletsprøjtes

AAA Clo

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hver 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 570-38

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Indhold : 1 liter

Analyse : 100 g/liter Clopyralid (9,56% w/w)

Registreringsindehaver:

3A KEMI

3A-Kemi A/S
Silkeborgvej 25
8464 Galten

Ukrudtsarter

AAA Clo anvendes primært til bekæmpelse af kurvblomstrede arter som kamille, tidsel, svinemælk, haremåd, gul okseeje, grå bynke, brandbæger samt snerlepleurt.

Bederoer

Anvend 0,25 l/ha i kombination med andre bredspektrede ukrudtsmidler. Midlet må kun bruges til plet eller båndsprøjtning og kun hvert 4. år.

Vinterraps

Der sprøjtes med 0,8 l/ha AAA Clo når væksten begynder om foråret. Må kun anvendes hvert 4. år.

Blandinger

AAA Clo kan normalt blandes med de mest anvendte midler. Husk altid at læse etiketten på blandingspartneren. Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger. AAA Clo bør ikke blandes med Safari.

Tilberedning af sprøjtveske

Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt AAA Clo og fyld resten af vandet i. Tilsæt eventuel tankblandingspartner. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjtestyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 300 liter per hektar.

ISO - AlM fladsprededyser ved 3 bar tryk og 6 km/t

Dysetørrelse	Ydelse (l/minut)	Væskemængde (l/ha)
02	0,8	160
025	1,0	200
03	1,2	240

Uønskede effekter

Uomsatte planterester fra en behandlet afgrøde kan give lokale skader på næste afgrøde. Afdrift kan skade kartoffel, ært, hestebønne, lupin, gulerod og andre skærmpanter voldsomt. Plantemateriale fra en behandlet afgrøde bør ikke bruges i drivhuse eller til kompost.

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Rengøring

Sprøjten rengøres grundigt efter sprøjtningen med rent vand tilsat egnet rengøringsmiddel. Vaskevandet udsprøjtes på allerede behandlede arealer.

Førstehjælp

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.
Indtagelse: Fremprovoker ikke opkast, opsøg læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.
Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Gå til kontrol hos en øjenlæge.