

# AB ACLONIFEN

## Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, pastinak, rodpersille, markærter, grønne ærter undtaget sukkerærter, gulerødder, sætteløg, skalotteløg og knoldselleri.

## DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 570-25

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Indhold : **10 liter**

Analyse : Acclonifen 600 g/liter

Registreringsindehaver:

**AGRO BIZZ**

Herluf Trolles vej 257

5220 Odense SØ

Tlf. 7020 4903

## ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen: Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler

Vask huden efter arbejdet

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, pastinak, rodpersille, markærter, grønne ærter undtaget sukkerærter, gulerødder, sætteløg, skalotteløg og knoldselleri.**

**Må i gulerødder, knoldselleri, sætteløg og skalotteløg samt i ærter undtaget sukkerærter ikke anvendes senere end 70 dage før høst.**

**Må i pastinak og rodpersille ikke anvendes senere end 16 uger før høst.**

**Må i kartofler ikke anvendes senere end 40 dage før høst.**

**Må i ærter med bælg ikke anvendes senere end 70 dage før høst.**

**Må i markærter ikke anvendes senere end 15 uger før høst, såfremt der behandles inden fremspiring.**

**Behandles der efter fremspiring, må midlet ikke anvendes senere end 9 uger før høst.**

**Midlet må ikke anvendes til behandling af to på hinanden følgende afgrøder i samme vækstsæson.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må ikke anvendes nærmere end 20 meter til vandmiljøet (vandløb, søer mv.).**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



Miljøfarlig

# BRUGSANVISNING

## Anvendelse

AB Aclonifen anvendes til en række afgrøder se i advarselsfeltet for godkendte afgrøder. Midlet har både jord- og bladvirkning.

## Doserings- og anvendelsekema

**Effektiv mod:** Agersennep, spildraps, agersvinemælk, burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, haremad, hyrdetaske, kamille, rød arve, tvetand, valmue, melde, raps, spergel, ærenpris, enårig rapgræs.

**Mindre god mod:** Stedmoder, fersken- bleg- snerle- og vejpileurt.

Kamille bekæmpes bedst før fremspiring.

Afgrøde	Tidspunkt	Dosering	Bemærk
Markært	Før fremspiring	2,0 2,5 l/ha	Højeste dosering til kamille, burresnerre, pileurt og rapgræs, suppler evt med Basagran 480 efter fremspiring
Markært	Efter fremspiring	0,75 – 1,0 l/ha + 0,4 l/ha Basagran 480	Når ærterne er 5-8 cm høje
		1. 0,5 l/ha + 0,4 l/ha Basagran 480 2. 0,5 l/ha + 0,5 l/ha Basagran 480	1. spr på kimblade 2. spr igen på kimblade
Kartofler	Når kartoflerne er færdighyppede, og kammen har sat sig umiddelbart før fremspiring (*)	1. 1,0 - 1,25 l/ha + 10 g Titus + sprede/klæbemiddel 2. 20 g Titus	Småt ukrudt lavt tryk af snerlepileurt, vejpileurt, ærenpris og stedmoder
		1. 1,75-2,0 l/ha + 10 g Titus + sprede/klæbemiddel 2. 20 g Titus	Større ukrudt og større ukrudtstryk
Gulerødder	Før fremspiring	2,0 – 2,5 l/ha	Laveste dosering på sandjord. Sikker effekt på kamille opnås kun ved behandling før fremspiring
	Splitbeh før og efter fremspiring	1. beh 1,0 – 1,75 l/ha 2. beh. 0,75 – 1,0 l/ha	Maksimalt må der bruges 2,5 l pr ha pr. år Splitbeh bedst mod svært bekæmpelig ukrudt. 3. beh kan være nødvendig
Sætteløg og skalotteløg	Når ukrudtet har kimblade	1. beh 1,5 l/ha	Lige efter plantning
		2 beh 0,5 – 1,0 l/ha	Nyt ukrudt på kimbladsstadiet
		3. beh 0,5 – 1,0 l/ha	Nye ukrudt på kimbladsstadiet, brug evt. Totril.

(\*) I kartofler beregnet til læggekartofler behandles senest en uge før fremspiring.

## Betydning af klima og jordtype

Den bedste effekt opnås ved sprøjtning ved temperaturer over 10°C og ingen udsigt til nattefrost. Produktet virker selv ved lave temperaturer. En bekvem jord med passende fugtighed giver den bedste effekt. På lette jorde anvendes laveste dosering. På svære lerjorde og jorde med høj humus indhold vil effekten blive bedst ved en bladsprøjtning.

## Risiko for skade

Der kan optræde forbigående gulfarvning af blade på afgrøden især hvis:

- Der kommer kraftig nedbør efter sprøjtning.
- Hvis der behandles i forbindelse med nattefrost.
- Hvis afgrøden behandles netop i når jordskorpen brydes.
- Hvis afgrøden dækkes med plast lige efter sprøjtning
- Hvis afgrøden har været dækket med plast og behandles udføres inden vokslaget dannes.

## Blandinger

AB Aclonifen kan blandes med de mest anvendte midler. Bland ikke med Basagran M75. Husk altid at læse etiketten på blandingspartnern. Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger.

## Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt AB Aclonifen. Tilsæt eventuel tankblandings-partner. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

## Rengøring af sprøjten

Efter sprøjtning rengøres sprøjten med vand og eventuelt et egnet rengøringsmiddel. Tom sprøjten på det allerede sprøjtede areal.

## Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 300 liter per hektar.

ISO – Alm fladsprededyser ved 3 bar tryk og 6 km/t

Dysetørrelse	Ydelse (l/minut)	Væskemængde l/ha
02	0,8	160
025	1,0	200
03	1,2	240

## Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæskan.

## Lagring

Lagres frostfrit i uåbnet emballage

## Førstehjælp

**Indånding:** Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

**Indtagelse:** Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

**Hudkontakt:** Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

**Øjenkontakt:** Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter. Gå til kontrol hos en øjnlæge.

Etiket nr.: I  
GODKENDT

19 APR. 2005

for pakninger på: 10L  
Miljøstyrelsen