

Etikette nr: 1  
GØDKENDT

20. oktober 2016

for pakninger på  
Miljøstyrelsen 5L



Læs først vedlagte brugsanvisning



 ATR Landhandel

# ATR CLOPICO

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse  
i vinter-og vårraps hvert 4. år.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af  
professionelle og anvendes erhvervmæssigt og  
kræver gyldig autorisation.

## DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 826-5

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler  
og plantebeskyttelses-middelforordningen 1107/2009.

Aktivstof: Picloram 67 g/L (5,75% w/w) + Clopyralid 267 g/L (22,92 % w/w),  
vandopløseligt koncentrat.

Batchnummer og produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: 2 år i forhold til produktionsdatoen



**Indhold: 5 Liter**

**STEFES** 

Registreringsindehaver

STEFES GmbH

Wendenstr. 21b, 20097 Hamburg

Tyskland

Tlf.: +49 (0)40 5330 8330, E-mail: [info@stefes.eu](mailto:info@stefes.eu)

 ATR Landhandel

Distributør

ATR Landhandel GmbH & Co. KG

Bahnhofsallee 44, 23909 Ratzeburg

Tyskland

Tlf.: +49 (0)4541 8060, E-mail: [info@atr-landhandel.de](mailto:info@atr-landhandel.de)

# ATR Clopico

## BRUGSANVISNING

### Generelt

ATR Clopico er et systemisk ukrudtsmiddel, som er effektivt over for tokimbladede ukrudtsarter i vinter- og vårraps. ATR Clopico må kun anvendes om foråret. ATR Clopico kan i vårraps anvendes indtil stadiet 14 og i vinterraps indtil stadiet 50 (knopper stadig omsluttet af blade). Senere anvendelse medfører risiko for afgrødeskade og dermed udbyttetab. ATR Clopico må kun anvendes på samme areal hvert 4. år. En række afgrøder er meget følsomme overfor ATR Clopico og man skal derfor være opmærksom på risikoen for vinddrift.

ATR Clopico kan ikke anvendes i sorten Mendel samt i vinter- og vårraps til fremavl. ATR Clopico er bl.a. effektiv overfor kamille, burresnerre, kornblomst, hvidmelet gåsefod (melder) snerle pileurt og tidsler. ATR Clopico skal anvendes sammen med et additiv f.eks. PG26N for at sikre effekten på hvidmelet gåsefod og burresnerre. Opbevares frostfrit.

### Virkemåde

ATR Clopico er et blandingsprodukt. ATR Clopico optages gennem bladene, og er regnfast efter 6 timer. Optimal effekt opnås ved behandling om morgenen, gerne ved temperatur 8-9°C. Undgå sprøjtning i perioder med frost, samt ved temperaturer over 25°C. Virkningen vil normalt kunne ses 1-2 dage efter behandlingen. Efter 3-4 uger vil ukrudtsplanterne visne bort.

### Resistensrisiko

ATR Clopico klassificeres som resistensklasse 0.

### Resistensforebyggelse

For at undgå udvikling af resistens anbefales det, at ATR Clopico anvendes som en del af et sprøjteprogram med andre midler med en anden virkningsmekanisme. Det anbefales endvidere at have både vår – og vinterafgrøder i sædskiftet, særligt i forbindelse med reduceret jordbehandling. Vær opmærksom på, at manglende effekt (hvis midlet ellers er anvendt korrekt) kan skyldes begyndende resistensudvikling.

## Omsåning samt efterfølgende afgrøde

Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med ATR Clopico pga. indholdet af clopyralid:- kartofler og andre natskyggearter – ært, hestebønne, lupin og andre bælgplanter – gulerod og andre skærmpflanter – salat og andre kurveblomstrede. Plantemateriale med rester af clopyralid kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Undgå derfor en følsom afgrøde umiddelbart efter, at plantemateriale fra en ATR Clopico behandlet afgrøde er nedpløjet.

Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som angivet på etiketten, og som er blevet findelt, spredt og nedpløjet om efteråret, vil ikke skade en forårs sået følsom afgrøde (se afsnittet ovenfor). Hvis der bliver behov for omsåning efter en ATR Clopico behandling, kan der kun sås korn, græs og majs. Behandlet plantemateriale må ikke anvendes i drivhuse eller til kompost.

Hvert 4.år.	Dosis pr/ha	Tidspunkt	Bemærkninger
Vinterraps	0,3 l	30-50	Lugtløs- og vellugtende kamille, snerlepileurt, kornblomst, tidsler (>90 %) Burresnerre (80-90 %)
Vårraps	0,3 l	12-14	Lugtløs- og vellugtende kamille, snerlepileurt, kornblomst, tidsler (>90 %) Hvidmelet gåsefod, burresnerre (80-90 %).

## Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjtestyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar. Kemikalierne tilsættes i sprøjtenes fyldeudstyr samtidig med vand og omrøring. Ved tankblanding bør der fyldes halvt med vand hvorefter den ønskede mængde ATR Clopico tilsættes. PGN tilsættes dernæst, der fyldes op med vand og omrøres.

Sprøjteteknik			
Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-015	2,5	6,6	100
ISO-020	2,5	5,8	150
ISO-025	2,5	5,5	200

## Rengøring af sprøjtemateriel

### Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel. Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Restsprøjtevæske og skyllevand kan udsprøjtes på det behandlede areal, under forudsætning af, at den maksimale dosering ikke herved overskrides.

### **Udvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldestyret:**

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets Bekendtgørelse 1752 af 14. december 2015. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

### **Bortskaffelse af tom emballage**

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

### **Bemærk**

ATR fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Vejret, sorter, resistens, behandlingsteknik, og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

## ATR CLOPICO

Picloram 67 g/l + Clopyralid 267 g/l SL

Nettoindhold: 5 L

### FORSIGTIG

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

**Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412).**

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovplichtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4.år.**

**For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder clopyralid, kun anvendes hvert 4.år (Spe1). Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må i vinterraps ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 50.**

**Må i vårraps ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 14.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.**

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

#### Førstehjælp:

**Generelle anvisninger:** Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

**Indånding:** Frisk luft, opsig lægehjælp.

**Hudkontakt:** Fjern forurenede tøj. Vask grundigt med vand og sæbe. Gerne under bruser.

**Øjenkontakt:** Fjern kontaktlinser. Spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter

**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning. Tilkald læge.