

Etikette nr:  
GODKENDT III

8. april 2015

for pakninger på  
Miljøstyrelsen 450g  
&  
10x450g

  
**Absolute® 5**  
 UKRUDTSMIDDEL

GRUPPE

B; F1

HERBICID




**Må kun anvendes til  
ukrudtsbekæmpelse i  
vinterhvede, vinterbyg, vinterrug  
og triticale**

Gældende fra 26. november 2015: Dette  
plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af  
professionelle og anvendes erhvervs-  
mæssigt og kræver gyldig autorisation.

® Varemærke registreret  
af DuPont.

**450 g e**
**Nødtelefon:** 0046 8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212

Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

Ukrudtsmiddel, nr. 3-170

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og  
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:

 Flupyrulfuron-methyl .....(CAS: 144740-54-5) .....83g/kg (8,3% w/w)  
 Diflufenican.....(CAS: 83164-33-4) .....417g/kg (41,7% w/w)

**Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage.**
**450g e**
**Minigranulat**

Midlet er et vanddispergerbart granulat

Se vedlagte brugsanvisning.


 DUPONT DANMARK ApS  
 Langebrogade 1 - 1411 København K  
 Tlf. 32 66 20 00  
 www.dupontagro.dk

Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato.

K-33926/31412  
DENMARK
 Fabrikations nr.:  
 Fabrikations dato:

**ADVARSEL**
**Brugsanvisningen skal følges for ikke at  
bringe menneskers sundhed og miljøet  
i fare (EUH401).**

 Meget giftig med langvarige virkninger  
for vandlevende organismer (H410).

 Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet  
har regler for arbejde med og udsættelse for  
plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det  
eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter  
kan medføre straf:*
**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede,  
vinterbyg, vinterrug og triticale og ikke senere end  
vækststadium 30.**
**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.  
Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet  
(vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand  
(SPe3).**
**For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre  
produkter, der indeholder flupyrulfuron-methyl, kun anvendes  
en gang om året og maksimalt i en dosering på 60 g/ha om  
efteråret eller om foråret (SPe1).**
**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med  
beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr  
nær overfladevand (SP1).**
**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**
**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og  
foderstoffer.**


CYAN MAGENTA JAUNE BLACK



**ADVARSEL**

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale og ikke senere end vækststadium 30.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).**

**For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder flupyrsulfuron-methyl, kun anvendes en gang om året og maksimalt i en dosering på 60 g/ha om efteråret eller om foråret (SPe1).**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).**

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale**

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs-mæssigt og kræver gyldig autorisation.

® Varemærke registreret af DuPont.

**450 g e**

**Nødtelefon:** 0046 8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212

Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

Ukrudtsmiddel, nr. 3-170

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:

Flupyrsulfuron-methyl .....(CAS: 144740-54-5) .....83g/kg (8,3% w/w)  
Diflufenican.....(CAS: 83164-33-4) .....417g/kg (41,7% w/w)

**Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage.**

**450g e**

**Minigranulat**

Midlet er et vanddispergerbart granulat

**Se vedlagte brugsanvisning.**

 DUPONT DANMARK ApS  
Langebrogade 1 - 1411 København K  
Tlf. 32 66 20 00  
www.dupontagro.dk

Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato.



K-33926/31412 - DENMARK

## BRUGSANVISNING

### Generel information

Absolute® 5 er et herbicid, som primært anvendes til efterårsbekæmpelse af agerrøvehale, vindaks, én-årig rapgræs og to-kimbladet ukrudt i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug, og triticale uden udlæg af græsser, kløver eller anden tokimbladet afgrøde.

Absolute® 5 indeholder to aktivstoffer, flupyr-sulfuron, en sulfonyleurea, der hæmmer celledelingen i vækstpunkterne og diflufenican, et anilid herbicid, der hæmmer carotenoid biosyntesen i ukrudtet og dermed afbryder fotosyntesen. Begge aktivstoffer optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte ukrudtsplanter med 1-3 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig. Varighed af virkning er længst ved lav jord temperatur. Diflufenican delen danner en slags film på jordoverfladen, hvorfra det optages ved fremspiring af nyt ukrudt. Synlig effekt fra diflufenicanen kan observeres efter 2-5 dage som afblegning, hvidfarvning og afsvidning af ukrudtet.

Sulfonyleureadelens virkning ses primært ved vækststandsning og hæmning af ukrudtets vækstpunkter, planterne ser "flade" ud, bliver gulfarvede for til sidst at visne, effekten ses om efteråret ofte først efter 3-6 uger. Effekt på græsserne ses bedst ved at trække i topskuddet, som løsnes efter påvirkning. Nyfremspiret ukrudt kan se upåvirket ud for så senere at antage de samme symptomer som sprøjet ukrudt.

Absolute® 5 nedbrydes hurtigst ved pH >7,7 og høj temperatur, langsomt ved pH 6 og derunder, samt lav jordtemperatur. På humusjorde kan der være nedsat effekt af diflufenican. God jordfugt på sprøjetidspunktet og i perioden umiddelbart herefter, vil øge effekten og langtidseffekten af diflufenican.

Der kan forekomme forbigående gulfarvning og eventuel vækststandsning af afgrøden, der dog normalt hurtigt forsvinder.

Absolute® 5 udsprøjtes ikke på en afgrøde der er stresset eller som på anden måde ikke er i god vækst. Det gælder en afgrøde, der er påvirket af tørke, er under vand, afgrøde der er svækket af sygdomsangreb eller insekter, afgrøde der mangler næring, eller som er påvirket af sammenpresset jord eller lave temperaturer. Afgrødens rodnet skal være veletableret og i aktiv vækst.

Klimaforhold, der primært giver påvirkning af afgrøden, er store temperatur udsving (> 15 °C) i mellem dag og nat, samt nattefrost.

For at opnå optimal ukrudtseffekt, skal der være ca. 4 timers tørvej efter udbringning af Absolute® 5, eller produktet skal nå at tørre ind på planterne

Absolute® 5 bør ikke udbringes på nytromlet afgrøde.

Undgå altid vinddrift til læhegn, naboafgrøder eller marker, hvor der skal dyrkes andet end korn. Tokimbladede afgrøder kan være meget følsomme for Absolute® 5.

Husk altid at rengøre sprøjten grundigt efter udbringning af Absolute® 5 - se separat sektion senere.

### Begrænsning i anvendelse

Absolute® 5 må kun anvendes i korn uden udlæg og frem til stadie 30 i vinterhvede, men kun til stadie 23 i de øvrige kornarter.

Der kan den følgende vækstsæson dyrkes korn med græsudlæg, vinter- og vårraps, majs, kartofler, roer, samt markærter. Det anbefales at pløje inden såning af vinterraps.

Der kan ikke dyrkes hestebønner, hør, grønsager eller anden specialafgrøde, hverken det år Absolute® 5 er anvendt eller det følgende år.

### Omsåning af et areal behandlet med Absolute® 5

Hvis en behandlet mark skal omsås, må der inden for 3 måneder efter behandlingen med Absolute® 5 kun sås vinter- og vårhvede. Ved omsåning i foråret af en afgrøde, som er efterårsbehandlet, kan der sås korn. Før såning bør der pløjes og harves i minimum 15 cm's dybde. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn må der ikke anvendes Absolute® 5 eller et andet sulfonyleurea produkt.

## Virkningsspektrum

### Virkningsspektrum

Når brugsanvisningen følges, har 60g Absolute® 5 effektiv virkning på de ukrudtsarter som er angivet i nedenstående tabel. Jordvirkning er vigtig for at opnå et godt resultat. Efterårsbekæmpelse er mere effektiv end en forårsbekæmpelse, da ukrudtet på dette tidspunkt dels er nyfremspiret og jordtemperaturen oftest lavere med bedre jordfugtighed.

Ukrudtsarter	Efterår Kimbl.-2 løvbl.	Efterår 3- 6 løvbl.	Forår Kimbl.- 4 løvbl.
Agerrøvehale**	S	S	M
Agersennep	VS	VS	VS
Agerstedmoder	S	MS	MS
Alm. brandbæger	S	S	S
Burresnerre *	N	N	N
Mark-forglemmigej	VS	S	MS
Alm. fuglegræs,	VS	VS	VS
Hyrdetaske	VS	VS	VS
Kamille spp.	VS	S	VS
Lugtløs kamille	VS	S	VS
Skive kamille	VS	S	S
Kornblomst	VS	S	S
Énårig rapgræs,	M	N	N
Spildraps	VS	S	VS
Storkenæb	VS	S	S
Rød tvetand,	VS	S	VS
Korn-valmue	S	S	M
Vindaks	MS	N	MS
Storkronet ærenpris	VS	S	M
Vedbend-ærenpris	MS	MS	N

\* Burresnerre skal have 1 krans.

\*\* Se afsnit om resistens.

VS = 95% eller mere bekæmpelse

S = 85 - 95% bekæmpelse

MS = 75 - 85% bekæmpelse

M = 75 - 60% bekæmpelse

N = < 60% bekæmpelse

Græsukrudt der spirer efter behandling bekæmpes ikke altid tilstrækkeligt. Bekæmpelsen afhænger af jordens surhedsgrad, fugtighed og temperatur. Forårsbekæmpelse er ofte ikke tilstrækkelig, men som opfølgende behandling og på småt nyfremspiret ukrudt er produktet effektivt.

På humusjorde kan der være nedsat effekt af diflufenican. God jordfugt på sprøjetidspunktet og i perioden umiddelbart herefter, vil øge effekten og langtidseffekten af diflufenican.

## Anvendelse

### Vinterhvede, Triticale, Vinterrug, Vinterbyg

Absolute® 5 må ikke anvendes i vinterbyg sorter, der er egnede til malt, da de kan skades. Det gælder f.eks. sorterne Wintmalt og Malwinta.

Absolute® 5 anvendes optimalt om efteråret. Behandling foretages bedst tidligt efter fremspiringen, når græsset har 1-3 blade, væksten stadig er aktiv, og vejret køligt, samt i det tidlige forår, når ukrudtet er kommet i vækst. Kun vinterhvede må behandles forår. Der kan udsprøjtes i perioder med nattefrost, men der vil ofte komme mere påvirkning/lysfarvning af afgrøden, og der skal være aktiv vækst i ukrudtet for at få fuld effekt.

Kornets vækstsstadie: fra 1-blad stadiet (vs 11) til begyndende buskning (vs 23). Optimalt på stadie 11 -12. Forårsbehandling

af vinterhvede til begyndende strækning (vs 30). Optimalt på stadie 23-25.

#### **Efterår:**

*Til bekæmpelse af agerrævehale, vindaks, énarig rapgræs, samt 2-kimbladet ukrudt:*

Dosering: 60 g Absolute® 5 pr. ha.

Tilsætning af klæbemiddel optimerer effekten. Bekæmpelsen kan efter behov suppleres med egnet partner f.eks. Boxer® eller Stomp® CS. Der bør ikke tilsættes klæbemiddel ved behandling af vinterbyg eller ved blanding med andre produkter.

Ved forekomst af énarig rapgræs eller ved forventet stor fremspiring af vindaks, tilsættes 0,5-1.0 l Boxer® eller Stomp® CS pr ha.

**For agerrævehale** gælder at, der bør tankblandes med Boxer® og/Stomp® CS for at modvirke resistens. Der anvendes en samlet dosering på mindst 2 - 2,5 l/ha (max dosering af Stomp® CS er 1 l/ha). Ved opfølgning i foråret anvendes Topik® EC + olie

#### **Forår (kun vinterhvede):**

Bemærk at Absolute® 5 ikke må anvendes om foråret hvis produktet er anvendt om efteråret i samme afgrøde.

*Til bekæmpelse af primært nyfremspiret 2-kimbladet ukrudt:*

Dosering: 60 g Absolute® 5 pr. ha. tidligt forår så snart der er lidt vækst i ukrudtet. Hvis græsukrudt ønskes bekæmpes skal det ske på småt nyfremspiret ukrudt med max 1-3 blade. Optimalt på før kornets stadie 25, der kan dog behandles til stadie 30.

Tilsætning af klæbemiddel optimerer effekten. Absolute® 5 bekæmper primært 2-kimbladede ukrudt om foråret.

#### **Blandinger**

Absolute® 5 kan blandes med Boxer® og Stomp® CS eller andre pendimethalin-holdige produkter, samt manganprodukter.

#### **Spredeklæbemidler**

Når Absolute® 5 anvendes alene, anbefales tilsætning af spredeklæbemiddel

Dosering: 0,05 % Agropol® eller DLG Contact®

#### **Resistens**

##### **Virkemåde gruppe:**

Absolute® 5 inderholder to aktivstoffer, som tilhører hver sin virkemåde:

Flupyr-sulfuron-methyl virkemåde gruppen:

**HRAC gruppe: B**

Diflufenican virkemåde gruppen:

**HRAC gruppe: F1**

Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en udvælgelse af evt.

naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive dominerende.

Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt fra HRAC gruppe: B, er der krydsresistens overfor andre midler i samme virkemåde. Der er fundet flere tilfælde af resistens over for sulfonylureamidlerne på ukrudtsarterne alm. fuglegræs, kornvalmue, lugtløs kamille, italiensk rajgræs, et enkelt tilfælde af hanekro og gul okseøj, samt flere tilfælde af agerrævehale.

Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af disse to midler.

#### **Anbefalinger**

- 1) Hvis der er konstateret resistens over for Absolute® 5, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet, effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor.
- 2) For at forebygge, at der opstår resistens, anvendes Absolute® 5 i tankblanding efter følgende retningslinjer:

#### **Efterårsanvendelse:**

Agerrævehale: Der tankblandes med 1 l Stomp® CS + 1 - 1,5 l Boxer® eller 2,5 l Boxer®.

Bredbladet ukrudt: Der tankblandes med 0,2 l Oxitril® CM eller Briotril®.



### Forårsanvendelse:

Hvor der er konstateret resistens mod Absolute® 5, anbefales det ikke at anvende Absolute® 5 om foråret.

### Sprøjeteknik, vandmængde og sprede/klæbemiddel

Absolute® 5 udsprøjtes med en teknik der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend fladsprededyser, f.eks. en ISO 110-02 dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse.

Der anvendes normalt 150-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning.

### Anbefalede vandmængder og sprøjeteknik:

Dyse: ISO F - 02-110 eller ISO LD-02-110

Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 l vand pr ha

Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l vand pr ha

Dyse: ISO F - 025-110 eller ISO LD-025-110

Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l vand pr ha

Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l vand pr ha

### Fremstilling af sprøjtevæsken

Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede mængde Absolute® 5 direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand. Klæbemiddel tilsættes til sidst. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet.

Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes dog straks.

### Sprøjteudstyr

Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages, så overlapninger undgås.

Straks efter endt udsprøjtning af Absolute® 5 skal sprøjtemateriellet rengøres grundigt, også selv om sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at "fedthinder" og belægninger af sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholder, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten.

### Rengøring af sprøjteudstyr efter Absolute® 5

Alle sprøjter skal have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10 - 15 % af tankens kapacitet, som sikrer tilstrækkelig rengøringen indvendig og evt. udvendig kan ske i den mark, der lige er behandlet.

Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er mindre end 2 % af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene vand i til 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tørt så godt som muligt imellem hver skylning/vask.

### Indvendig rengøring af sprøjten.

**BEMÆRK!** Husk Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.
2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand.

Skyllevandet sprøjtet udover den afgrøde, der lige er sprøjtet.

3. Fyld næste 1/3 af det rene vand i tanken og tilsæt 0,5 liter Al Clear™ Extra. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet.

4. Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 af det rene vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.

5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand).

Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder.

En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.

6. Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear™ Extra pr. 10 liter vand.

### Bortskaffelse af tom emballage og rester

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

EAK-kode:020108



## FORHOLDSREGLER

**Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år.** Undtagelser - se Arbejdstilsynets vejledning: "Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler".

- **ved fremstilling af sprøjtevæsken anvendes:**  
Handsker, støvler og evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.
- **ved udbringning anvendes:**  
**Marksprøjte** (spredebom på traktor, bom < 1 m over jordoverfladen, tryk < 3 bar): Handsker, støvler og overtræksbukser. Hvis førerhuset er lukket, anvendes handsker og overtræksbukser kun udenfor førerhuset. Se også Arbejdstilsynets vejledning: "SIKKERHED OG BEKÆMPELSMIDLER".
- **ved transport:**  
ADR/RID: UN-Nr.: 3077  
Benævnelse: Miljøfarligt fast stof n.o.s. (Diflufenican, flupyrsulfuron methyl) 9, III.

## FØRSTEHJÆLP

**Indånding:** Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning.

**Indtagelse:** Fremkald ikke opkastning uden lægelig kontrol. Drik 1 eller 2 glas vand. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget

gennem munden. Søg læge i alvorlige tilfælde. Ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt.

**Hudkontakt:** Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis nødvendigt.

**Øjenkontakt:** Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer.

**Nødtelefon:** 0046 8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212

## BRAND

Evakuer området straks, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet, og om der evt. er andre farlige stoffer som f.eks. gødning.

Passende slukningsmidler: CO<sub>2</sub>, pulver, vandtåge eller skum. Nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.

Anvend så lidt vand som muligt, og undgå at det kommer i kloak, brønde eller vandløb.

Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn. Undgå indånding af røg/damp da den indeholder kulilte, svovlilte og kvælstofilter. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.

Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt tillader det, bør ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område.

## SPILD

Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer produktet i vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks kommunens tekniske forvaltning, brandvæsen eller politiet.

Produktet fejles sammen og opsamles sammen med evt. forurenede jord i tæt lukket beholder med spændelåg som afleveres til den kommunale modtageordning for farligt affald. Hvis der er spildt nær værdifulde beplantninger, fjernes straks 5 cm af jordoverfladen.

Ved håndtering af produkt og spild anvendes handsker, støvler og evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Kemikalie affaldsgruppe:

EAK-kode:020108

## Varemærke registreret af:

Absolute® 5, Ally®, Express®, Harmony®, LEXUS®: DuPont; ALL CLEAR®: Service Chemicals; Kerb®: Dow AgroSciences; Boxer®, Topik®: Syngenta; Stomp® CS: BASF

Sælger påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af fejlagtig anvendelse, anvendelse udover det i brugsanvisningen eller anden anvisning angivne eller anvendelse under unormale kulturbetingelser.

Sælger fraskriver sig under alle forhold ansvaret for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I øvrigt henvises til bestemmelserne i salgs- og leveringsbetingelserne.







DENMARK

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale**

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

**ADVARSEL**

**Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).**

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:*

**Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterbyg, vinterrug og triticale og ikke senere end vækststadium 30.**

**Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.**

**Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).**

**For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder flupyr-sulfuron-methyl, kun anvendes en gang om året og maksimalt i en dosering på 60 g/ha om efteråret eller om foråret (SPe1).**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).**

**Opbevares utilgængeligt for børn (P102).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



© Varemærke registreret af DuPont.  
K-33927/31412

# 10 x 450 g



(01)53576960038077

**Nødtelefon:** 0046 8 337043 eller Giftlinjen (Bispebjerg hospital) 82121212

Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

Ukrudtsmiddel, nr. 3-170

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:

Flupyr-sulfuron-methyl .....(CAS: 144740-54-5) .....83g/kg (8,3% w/w)

Diflufenican .....(CAS: 83164-33-4) .....417g/kg (41,7% w/w)

**Opbevares tørt og køligt i tæt lukket emballage.**

**10x450g**

**Minigranulat**

Midlet er et vanddispergerbart granulat

**Se vedlagte brugsanvisning.**



DUPONT DANMARK ApS  
Langebrogade 1 - 1411 København K  
Tlf. 32 66 20 00  
www.dupontagro.dk

Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabriktions dato.

Fabrikations nr.:  
Fabrikations dato:

P. 186 P. 362 NOIR

