




MAKHTESHIM
A G A N
BENELUX & NORDIC



Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd, ærter og kartofler



UKRUDTSMIDDEL

Deklaration : Ukrudtsmiddel, nr 396-36
Analyse : Pendimethalin 400 g/kg (40%)
Vand dispergerbar granulat
Vægt : Nettoindhold **5 kg**

Godkendelsesindehaver:
Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87,
NL 3832 GK Leusden, Holland
www.mabeno.com

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelsehandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd, ærter og kartofler.

Må i vårsæd ikke anvendes senere end 6 uger før høst.

Må i friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst.

Må i tørrede ærter (bælgfrugt) ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.

Må i kartofler ikke anvendes senere end 13 uger før høst.

Må i vinter- og vårsæd og kartofler ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Må i ærter ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Førstehjælp

Indånding

Flyt den tilskadedkomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning.

Hudkontakt

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Fjern forurenede klæder. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

Øjenkontakt

Bliv ved med at skylle øjet med rent vand i 20-30 minutter, idet øjenlågene hyppigt trækkes tilbage. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

Indtagelse

Giv vand at drikke. Søg omgående lægehjælp.



MABACDK5/A/01

Productname	Activus® 40 WG		
Country	Denmark		
Package size	5 Kg		
Label code	MABACDK5/A/01	Name	Taco Plinck
Label dimensions	428 x 222 (h x w)	Draft	Approved
Label date	June 2013		

Activus® 40 WG

BRUGSANVISNING

Virkemåde

Activus 40 WG er et bredspektret ukrudtsmiddel med virkning mod enårige græsser samt tokimbladet frøkrudt i korn, ærter og kartofler. Activus optages af ukrudtets blade og rødder og kan derfor anvendes før eller efter fremspiring.

Afgrøder

I vintersæd (hvede, rug, triticale og byg) og ærter anvendes Activus 40 WG enten før eller efter fremspiring. I vårsæd anvendes Activus 40 WG efter fremspiring. Kartoffler behandles før fremspiring.

Dosering og blandinger . Der må højst anvendes én maksimal dosering pr. afgrøde.

Anvendelse	Udviklingsstadiet	Dosering
Vintersæd efterår: Hyrdetaske, tvetand, valmue, fuglegræs og ærenpris	Stadie 00-13	1,25 kg/ha
Vårbyg og vårhvede: Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris og stedmoder.	Stadie 10-13	1,0 kg/ha
Vårbyg/hvede med udlæg af kløver: Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris og stedmoder.	Stadie 10-13	1,0 kg/ha
Markært: Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris og stedmoder.	Stadie <9 Afgrøde 3-5 cm Afgrøde 2-3 cm + 7-10 dage senere Stadie 00-08	1,875 kg/ha 1,5 kg/ha 0,75 kg/ha 0,75 kg/ha
Kartofler: Hvidmelet gåsefod, tvetand, ærenpris og stedmoder.		1,25 l/ha

I vintersæd før fremspiring anvendes Activus fra 0-5 dage efter såning, på fugtig jord evt. efter tromling. Efter fremspiring anvendes Activus bedst, når kornet har 1-2 blade og ukrudtet står på kimbladstadiet.

Før fremspiring anvendes 0,5-1,25 kg/ha mod bredbladet ukrudt. Activus 40 WG kan i efteråret blandes med f.eks. Lexus, Boxer, Briotril 400 EC samt Primera Super

I vårsæd anvendes Activus 40 WG efter fremspiring, når det tokimbladede ukrudt har udviklet 2 løvblade. Normalt anvendes Activus 40 WG i tankblanding med f.eks. Briotril 400 EC eller Express ST.

I vårsæd med udlæg af græs eller kløvergræs anvendes en kombination af Activus 40 WG + Basagran M75 eller Fighter 480. Behandling-en udføres på ukrudt med max. 2 løvblade. Kløveren skal på behandlingstidspunktet have udviklet spadeblad. Sådybden skal sikre at der ikke opstår direkte kontakt mellem frøene og sprøjtevæsken. Morgen behandling foretrækkes da der helst skal være en høj luftfugtighed og dagtemperatur bør komme over 12° C, samtidig med at nattemperaturen ikke bør komme under 5° C. Behandlingen udføres med 0,25-1,0 kg/ha Activus 40 WG + 1,5 l/ha Basagran M75 eller 1,0 l/ha Fighter 480 + olie.

Ærter behandles før eller efter fremspiring med Activus 40 WG. Ved behandling før fremspiring anvendes der 0,5-1,875 kg/ha.

Behandling efter fremspiring anvendes Activus 40 WG i tankblanding med Fighter 480 eller Basagran M75 i en delt behandling. Første behandling udføres på 2-3 cm høje ærter og gentages når de er 4-6 cm høje. Doseringen af Activus 40 WG er i begge behandlinger 0,75 kg/ha + 0,4-0,5 l/ha Fighter 480 eller 0,75 l/ha Basagran M75/ha.

Kartofler behandles med 0,5-1,25 kg Activus/ha før fremspiring. Behandlingen udføres, når kartoflerne er færdighyppede og kammene har sat sig. Kammen bør af hensyn til effekten være fugtig på behandlingstidspunktet for at sikre den bedste virkning. Hermed sikres en god effekt på en lang række tokimbladet ukrudt. For at sikre effekten mod f.eks. kamille, hvidmelet gåsefod og pileurter kan det anbefales at tankblende med Fenix. Virkning på humusholdig jord kan være nedsat pga. at aktivstoffet bindes til det organiske materiale. Store mængder af planterester kan forårsage uens fordeling af produktet og deraf følgende uens virkning.

Sprøjteteknik

Under normale behandlingsbetingelser anvendes 150-200 liter vand/ha. Activus 40 WG er ikke farlig for bier og må derfor anvendes i biernes flyvetid.

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet omsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

HUSK, at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten bedst i marken.

Der henvises i øvrigt til Miljøministeriets BEK nr. 268 af 31/03/2009 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter samt EU direktiv 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om pesticidudbringningsmaskiner.

Resistens:

Pendimethalin er ifølge HRAC (ukrudts resistens komiteen) karakteriseret som tilhørende resistens gruppe K1. Risikoen for forekomst af resistente ukrudts arter er ifølge Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet vurderet som lav ved anvendelse af Activus, dog bør tankblandinger med produkter med anden virkemekanisme eller skift mellem midler altid tages i betragtning for at mindske risikoen for resistens.

Blandinger

Activus 40 WG kan tankblandes med Briotril® 400 EC, Lexus®, Boxer®, Legacy®, Primera Super®, Fenix®, Fighter® 480, Basagran M75 og Glyphosat.

Fremstilling af sprøjtevæsken

Beholderen fyldes halvt med vand, tilsæt den beregnede mængde Activus. Hold omrøreren i gang og tilsæt evt. blandingspartneren. Fyld herefter tanken op med vand samtidig med at omrøreren holdes i gang. **Activus skal tilsættes langsomt under omrøring så granulatet opløser sig når det kommer i vand.**

Tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Produktansvar

Informationen om produktets anvendelse er baseret på producentens seneste erfaringer, og er derfor alene at forstå som anbefalinger: Mange faktorer, såsom vejrforhold, jordtype, sortresistens, sprøjteteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets effekt. Makhteshim-Agan påtager sig intet ansvar for følgerne af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af produktet i strid med medfølgende instruktioner, ligesom Makhteshim-Agan ikke påtager sig ansvaret for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab og ligende. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres Leverandør.


Activus® er et registreret varemærke
Feinchemie Schwebda GmbH

Registrerede varemærker:

Activus® - Feinchemie Schwebda GmbH
Briotril® - Agan Chemical Manufacturers
Lexus® - E.I. du Pont de Nemours & Company
Boxer® - Syngenta
Primera® Super, Fenix® - Bayer CropScience AG
Fighter®, Basagran® - BASF Aktiengesellschaft

MABACDK5/B/01

Productname	Activus® 40 WG		
Country	Denmark		
Package size	5 Kg		
Label code	MABACDK5/B/01	Name	Taco Plinck
Label dimensions	428 x 222 (hxw)	Draft	Approved
Label date	June 2013		




MAKHTESHIM
A G A N
BENELUX & NORDIC



Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd, ærter og kartofler

UKRUDTSMIDDEL



Deklaration: Ukrudtsmiddel, nr 396-36
Analyse: Pendimethalin 400 g/kg (40%)
Vand dispergerbar granulat
Vægt: Nettoindhold **20 kg**

Godkendelsesindehaver:
Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87,
NL 3832 GK Leusden, Holland
www.mabeno.com

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. (R43)

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R50/53)

Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelsehandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårsæd, ærter og kartofler.

Må i vårsæd ikke anvendes senere end 6 uger før høst.

Må i friske ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 10 uger før høst.

Må i tørrede ærter (bælgfrugt) ikke anvendes senere end 3 måneder før høst.

Må i kartofler ikke anvendes senere end 13 uger før høst.

Må i vinter- og vårsæd og kartofler ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Må i ærter ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Førstehjælp

Indånding

Flyt den tilskadedekomne ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning.

Hudkontakt


Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand. Fjern forurenede klæder. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

Øjenkontakt

Bliv ved med at skylle øjet med rent vand i 20-30 minutter, idet øjenlågene hyppigt trækkes tilbage. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

Indtagelse

Giv vand at drikke. Søg omgående lægehjælp.



DENMARK



Lokalirriterende



Miljøfarlig

MABACDK5/C/01

UN 3077

Productname	Activus® 40 WG		
Country	Denmark		
Package size	20 Kg		
Label code	MABACDK5/C/01	Name	Taco Plinck
Label dimensions	190 x 340 (hxw)	Draft	Approved
Label date	June 2013		