

L1081573 DENM/10Z



Afinto®

syngenta®

4 x 2 KG

Opbevaras frostfritt/Oppbevaras frostfritt
Förvaras frostfritt/Suojattava pakkaselta

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON
are Trademarks of a Syngenta Group Company



®

Etikette nr.:
GODKENDT
29. november 2021

for pakninger på
Miljøstyrelsen
Firmasiden *ds.2*
2kg & 4x2kg



Afinto®

syngenta.

UFI: 62J6-F9FJ-6X8Y-WK8U

INSEKTMIDDEL

GROUP 29 INSECTICIDE

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korn, kartofler, æbler, pærer, bederoer samt i friske bønner med bælg og friske ærter med og uden bælg.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

2 KG e



ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korn, kartofler, æbler, pærer, bederoer samt i friske bønner med bælg og friske ærter med og uden bælg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 77.

Må i kartofler ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

Må i friske bønner med bælg og ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Insektmiddel nr. 352-19

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidelforordningen 1107/2009.

Analyse: Flonicamid 500 g/kg (50 % w/w)

Indeholder dinatriummaleat. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Midlet er et vanddisperserbart granulat.

Mindst holdbar i 2 år fra produktionsdatoen som står anført på emballagen.

Samme sted findes også batchnummer.

Distributør: Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 København S,
Tel. 32 87 11 00

Registrering: ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.
Pegasus Park - De Kleetlaan 12B
B-1831 Diegem - Belgium



FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

Indånding: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

Huden: Fjern forurenede tøj. Skyl straks huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338). Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Indtagelse: Rens munden med vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt læge.

BRUGSANVISNING

Generelt

AFINTO® anvendes mod bladlus i korn, kartofler, pærer, bederoer samt i friske bønner med bælg og friske ærter med og uden bælg.

Afinto er systemisk virkende, idet aktivstoffet transporteres opad og udad i planten. Midlet virker også ved at trænge gennem bladene (translaminær virkning), så der er gode muligheder for at bekæmpe selv godt gemte bladlus. Virkningen er ikke temperaturafhængig (undgå dog behandling i forbindelse med lave temperaturer eller frost). Afinto virker ved at stoppe fødeindtaget efter få timer, hvorefter skadedyrene dør af sult i løbet af nogle dage. Der er altså ikke en egentlig knockdown effekt, men skadevirkningen er stoppet næsten øjeblikkeligt. Virkningstiden er op til 4 uger.

ANVENDELSE

Vinterhvede, vårhvede, rug, triticale og spelt

Afinto bekæmper bl. a. kornbladlus, græsbladlus og havrebladlus. Anvend 100-140 g Afinto pr. ha med ca. 3 ugers interval, når skadetærsklen er overskredet i BBCH 21-BBCH 77 (fra buskning til sen mælkemodenhed). Den lave dosering anvendes kun under optimale betingelser. Effekten mod lavtsiddende lus kan være usikker. Maksimalt 2 sprøjtninger pr. sæson. Vandmængde: 150-300 l/ha.

Vinterbyg, vårbyg og havre

Afinto bekæmper bl. a. kornbladlus, græsbladlus og havrebladlus. Anvend 100-140 g Afinto pr. ha når skadetærsklen er overskredet i BBCH 21-BBCH 77 (fra buskning til sen mælkemodenhed). Den lave dosering anvendes kun under optimale betingelser. Effekten mod lavtsiddende lus kan være usikker. Maksimalt 1 sprøjtning pr. sæson. Vandmængde: 150-300 l/ha.

Æbler og pærer

Afinto bekæmper bl. a. grøn og rød æblebladlus samt pærebladlus. Anvend 140 g Afinto pr. ha med ca. 3 ugers interval ved begyndende angreb. Maksimalt 3 sprøjtninger pr. sæson. Vandmængde: 200-1000 l/ha afhængig af træstørrelse, tæthed og sprøjteudstyr

Kartofler

Afinto bekæmper bl. a. ferskenbladlus, nasturtiebladlus, tørstetræbladlus, sribet kartoffelbladlus og kartoffelbladlus. Anvend 160 g Afinto pr. ha, når bladlus optræder. Virkningstiden er normalt mindst 3 uger, hvorefter behandlingen kan gentages. Maksimalt 2 sprøjtninger pr. sæson. Vandmængde: 200-500 l/ha afhængig af bladmasse og sprøjteudstyr.

Bederoer

Afinto bekæmper bl. a. ferskenbladlus og bedebladlus. Anvend 140 g

Afinto pr. ha når skadetærsklen er overskredet i BBCH 16-BBCH 49 (fra 6 løvbladpar til fuldt udviklet rod. Bemærk dog behandlingsfrist på 60 dage). Maksimalt 1 sprøjtning pr. sæson. Vandmængde 200-600 l vand pr. ha.

Friske bønner med bælg og friske ærter med og uden bælg

Afinto bekæmper bl. a. ærtebladlus og bedebladlus. Anvend 140 g Afinto pr. ha når skadetærsklen er overskredet i BBCH 11-BBCH 71 (fra første løvblad til 10 % bælg i fuld størrelse). Vær særligt opmærksom i BBCH 50-71 (fra blomsterknopdannelse). Maksimalt 1 sprøjtning pr. sæson. Vandmængde 200-600 l vand pr. ha.

BLANDINGER

Afinto er blandbar med aktuelle svampe- og insektmidler.

PLANTETOLERANCE

Afinto er fuldt ud skånsom over for de nævnte afgrøder.

NYTTEDYR

Afinto er skånsom overfor bier, humlebier, rovmider og andre nyttedyr.

RESISTENS

Flonicamid tilhører sin egen resistensgruppe (IRAC gruppe 29) som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. Der er ikke kendskab til krydsresistens til andre aktivstoffer.

Gentagen anvendelse af samme type middel kan resultere i dannelse af resistens. Det anbefales derfor at veksle med andre middeltyper med jævne mellemrum.

BLANDING AF SPRØJTEVÆSKE

Fyld tanken med den halve vandmængde. Tilsæt Afinto under omrøring og fyld op med vand. Udsprøjtes straks. Hold omrøringen i gang under udsprøjtningen.

Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling.

Restsprøjtbevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt efter brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1401 af 26.11.2018 eller eventuel senere udgave.

OPBEVARING

Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtbevæske. Emballagen må ikke genbruges.

MINDRE ANVENDELSE

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel i en afgrøde af mindre betydning, og som ikke nødvendigvis er nævnt på midlets etikette.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til mindre anvendelse følges. Ansøgeren kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde. Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til mindre anvendelse følges.

| Afgrøde | Skadegører | Dosering pr. ha | Tidspunkt | Bemærkninger |
|---|------------|-----------------|-----------------------|---|
| Prydplanter i væksthuse | Bladlus | 140 g | Ved begyndende angreb | Maksimalt 3 behandlinger pr. kultur. Udfør evt. prøvesprøjtning i nye sorter/kulturer |
| Planteskolekulturer og prydplanter på friland | Bladlus | 140 g | Ved begyndende angreb | Maksimalt 2 sprøjtninger pr. år. Udfør evt. prøvesprøjtning i nye sorter/kulturer |

| Afgrøde | Skadegører | Dosering pr. ha | Tidspunkt | Bemærkninger |
|--------------------|------------|-----------------|---|--|
| Havefrø til frøavl | Bladlus | 140 g | Ved begyndende angreb. Gentages 3 uger senere ved behov | Maksimalt anvendes 2 gange i afgrøden. Halm må ikke bruges til opfodring. Anvendelse bør aftales med den lokale konsulent og/eller det frøfirma, der er avlskontrakt med |

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige relevante bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.



Afinto®

syngenta.

UFI: 62J6-F9FJ-6X8Y-WK8U

INSEKTMIDDEL

GROUP 29 INSECTICIDE

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korn, kartofler, æbler, pærer, bederoer samt i friske bønner med bælg og friske ærter med og uden bælg.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

2 KG e



ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korn, kartofler, æbler, pærer, bederoer samt i friske bønner med bælg og friske ærter med og uden bælg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i korn ikke anvendes senere end vækststadiet BBCH 77.

Må i kartofler ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i æbler og pærer ikke anvendes senere end 21 dage før høst.

Må i bederoer ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

Må i friske bønner med bælg og ærter med og uden bælg ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Insektmiddel nr. 352-19

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidler forordningen 1107/2009.

Analyse: Flonicamid 500 g/kg (50 % w/w)

Indeholder dinatriummaleat. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208).

Midlet er et vanddispgerbart granulat.

Mindst holdbar i 2 år fra produktionsdatoen som står anført på emballagen.

Samme sted findes også batchnummer.

Distributør: Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S,
Tel. 32 87 11 00

Registrering: ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

Pegasus Park - De Kleetlaan 12B

B-1831 Diegem - Belgium

