

Agro-Glyfo Toupar

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til visse former for ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning Gældende fra 26. november 2015:
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410)
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf :

Må kun anvendes til :
Ukrudtsbekæmpelse samt nedvisning i korn, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner og græs. Må ikke behandles senere end 10 dage for høst.
Ukrudtsbekæmpelse under frugttræer indtil 1 måned for høst og om efteråret efter høst.
Ukrudtsbekæmpelse efter såning og for fremspiring samt selektiv ukrudtsbekæmpelse i jordbrug ved hjælp af specielt udstyr.
Ukrudtsbekæmpelse i ikke spiselige havebrugs-, planteskole- og skovkulturer.
Ukrudtsbekæmpelse på parkeringsarealer, veje, indkørsler, fortove, havegange, terrasser og udrykkede arealer.

Må ikke anvendes til :
Ukrudtsbekæmpelse på offentlige arealer i perioder, hvor der findes spiselige bær og frugter på arealet
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb og søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. (SPe3)
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 600-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidler forordningen 1107/2009. Aktivstof: Glyphosat 360 g/l (30,8 w/w).
Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

Emballage : **5 L**

Registreringsindehaver :
SAPHIRE
J. Mertensstraat 142
1702 DILBEEK - BELGIUM

Batchnummer er placeret på emballagen.
Produktionsdatoen er anført på emballagen og holdbarheden er mindst 2 år.

Etikette nr: III
GODKENDT

23. oktober 2015
for pakninger på

Miljøstyrelsen 1L, 5L,
20L &
1000L

Brugsanvisning

Generelt

Agro-Glyfo Toupar anvendes til bekæmpelse af kvik og andre græsser, tokimbladet ukrudt og til nedvisning af korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner, på stubmarker, i frugtplantager, i havebrugs-, planteskole- og skovkulturer, samt på udrykkede arealer.
Agro-Glyfo Toupar anbefales ikke i afgrøder til fro og sået ukrudt optages gennem bladene og fordeles sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten også rodsystemet. Effekten vil normalt kunne ses efter 10-14 dage.

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjteudsigt Udrykkede- og utilplantede arealer

Agro-Glyfo Toupar kan anvendes på utilplantede arealer gennem hele væksten. Ukrudtet optages gennem bladene og fordeles sig med plantens saftstrøm rundt i hele planten også rodsystemet. Effekten vil normalt kunne ses efter 10-14 dage.
Ukrudtsbestand anvendes 6 liter/ha. 10 dage efter behandling kan jorden bearbejdes.

Forårsanvendelse

Der kan behandles med kvik og andet ukrudt før jordbearbejdning. Kvikken bør normalt have 3-4 blade. Dosering til delvis udvintret korn: 1,0-1,5 l/ha. Dosering til kvik: 3-4 l/ha.

Korn for høst

Til bekæmpelse af kvik, andre græsser samt tokimbladet ukrudt, i alle kornarter og sorter. Kvikken bør være i vækst på behandlingstidspunktet. Der behandles, når kærnerne er hårde, og når mærket efter en fingernagel kan ses blivende på kærnen. Dosering: 3-3 l/ha. Højeste dosering ved stor kvikmængde (> 25 skud/m²). Sprøjtefrist 10 dage for høst.

Ærter og hestebønner for høst

Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Ærterne behandles når 70-75% af marken har skiftet farve fra gulgrøn til gulbrun. Det betyder, at ærterne fra de øvrste bælg skal være til at dele med fingrene. Ærternes vandindhold er ca. 30%. Dosering: 3-4 l/ha. Højeste dosering til nedvisning. Sprøjtefrist 10 dage for høst.

Raps, sennep og rybs for høst

Til bekæmpelse af kvik og tokimbladet ukrudt samt nedvisning. Der behandles, når vandprocenten i afgrøden på den mindst modne del af marken er under 30%. Så er størstedelen af skulperne i rapsen gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø. Behandlingstidspunktet er normalt 2-4 dage før normal skårlægningstidspunkt, og 14-21 dage før en direkte høst. Dosering: 3 l/ha. Sprøjtefrist 10 dage for høst.

Stubmarker

Til bekæmpelse af kvik og andre græsser, samt tokimbladet ukrudt. Kvikken skal have 3-6 blade og være ca. 15-20 cm høj. For at opnå det bedste resultat må halm og lignende fjernes. Dosering til spildkorn og småt tokimbladet ukrudt: 1,5-2 l/ha. Højeste dosering til kvik: 3-4 l/ha. Laveste dosering ved gunstige betingelser: Høj luftfugtighed, temperatur over 15 °C og solskin fra sprøjteudsigtspunktet.

Stubmarker efter frogræs

Halmen og plantematerialet bør fjernes hurtigt efter høst, således at der kan komme en god genvækst. Det behandles, når kvikken og græsserne har 3-6 blade. Dosering: 4-6 l/ha. Højeste dosering på rodvæving, engrasgræs eller andre smallebladede frogræsser.

Græs

For sidste slået sprøjtes når græs og kvik er 10-20 cm høj (3-6 blade). Sprøjt mindst 10 dage før sidste slået græs. Græsset må anvendes til alle normale formål, umiddelbart efter behandlings-fristens udløb. Dosering: 4 l/ha.

Grankulturer

I grankulturer af rødgran, normannsgran og kæmpegran kan produktet anvendes med 3,0-3,5 l/ha. Behandling foretages om efteråret, når stråkningsvæksten er afsluttet, og forårsskuddene er modne og endeknopperne er dannet. Tidligst når granerne er groet fast på blivende sted.

Frugtplantager og andre træskulturer

Der behandles med 3-6 l/ha på ukrudt i god vækst, senest en måned før frugtmodning eller høst. Kulturen må ikke rammes, og der anvendes skærmt behandling, ram ikke rodskud.

Stødbehandling af fældede træer

Anvendes mod genvækst og rodskud, dosering 0,2 l pr. 1,0 l vand. Der behandles umiddelbart efter fældning på træets snitflade med pensel eller rygsprøjte. Behandling foretages, når træernes saftstrøm er nedgående, d.v.s. fra oktober til slutningen af februar. Bemærk at der kan være risiko for rodsammletninger, og dermed mulighed for skade på nabotræer.

Tilberedning af sprøjteveske

Sprøjteanken fyldes 3/4 med vand, og Agro-Glyfo Toupar tilsættes under omrøring mens tanken fyldes op med vand.

Dyse	Sprøjte teknik		
	Bar	Km/time	l/ha
ISO-F-02-110 Gul	3	6,4	150
ISO-F-025-110 Lilla	3	6,1	200

Sprøjte teknik

Det er vigtigt, at sprøjtestyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder for 150 til 200 liter pr ha. Anvend lodrigt dyser, hvor der er risiko for adrift.

Rygsprøjt

Anvendes til ukrudtsbekæmpelse på mindre arealer såsom hegn, omkring buske o.l. Sprøjt kun på det, der ønskes bekæmpet og vær opmærksom på vinddirret i forbindelse med udsprøjtningen. Dosering: 0,2-0,3 l pr. 10-15 l vand.

Tankblanding

Agro-Glyfo Toupar kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlings-tidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjtetømmes hurtigst for sprøjteveske i marken. Sprøjt skylles grundigt med rent vand. Skyll vandet udsprøjtet på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjtten og tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal. Skyl efter med rent vand, som udsprøjtet på det allerede behandlede areal.

Lagring

Agro-Glyfo Toupar skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmefælder.

Bortskaffelse af tom emballage

Inholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyll vandet høvels op i sprøjtevesken. Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk

Saphire fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forsikringsmæssigt brug eller opbevaring.

Vejrtil, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

SAPHIRE