

Agro Bizz Clomazon CS

Ukrudtsmiddel.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, vinterraps, ærter og gulerod.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden (R42/43)

Undgå indånding af aerosoltåger (S23).

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37).

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for

anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets

informations-materiale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofler,

vinterraps, ærter og gulerod.

Må i kartofler kun anvendes efter lægning og ikke

senere end 5 dage før fremspiring.

Må i vinterraps kun anvendes efter såning og ikke senere end 3 dage efter.

Må i ærter og gulerødder ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

Efter dyrkning af kartofler, ærter og gulerødder må der ikke plantes/sås kortvarige

efterfølgende afgrøder i samme vækstsæson.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m. fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at

beskytte organismer, der lever i vand.

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn(S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer(S13)

Ukrudtsmiddel nr.: 645 – 28

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Clomazon 360 g/l (34,8 % w/w) ved 20° C.
Indeholder polymethylenpolyphenylisocyanat

Nettoindhold: 1 + 3 + 5 liter.

Importør: Agro Bizz 012A/S – Herluf Trolles Vej 257 – 5220 Odense SØ

Førstehjælp: Er patienten bevidstløs skal denne hurtigst muligt under lægebehandling.

Indånding: Bring personen ud i frisk luft, ved fortsat ubehag konsulteres læge.

Huden: Kommer stoffet på huden vaskes straks med rigelig mængde vand.

Fjern forurenet tøj, tøjet vaskes før det bruges igen.

Øjnene: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand i mindst 15

minutter, konsulter øjenlæge / skadestue.

Indtagelse: Hvis patienten er ved bevidsthed, skyl munden og drik rigeligt med vand

Konsulter læge.

Medbring etiketten eller sikkerhedsdatablad ved lægekontakt. En læge der behandler kan

indhente mere information ved Giftlinien på Bispebjerg Hospital tlf.: 82 12 12 12 .

Vejtransport: Varen er uden for klassificering.



Sundhedsskadelig

Brugsanvisning

Anvendelse: Agro Bizz Clomazon CS bruges til ukrudtsbekæmpelse i kartofler, vinterraps, ærter og gulerod.

Virkemåde: Aktivstoffet clomazon optages i spiringsfasen via kimstængel og rodned. Clomazon påvirker dannelsen af klorofyl og hindrer derved fotosyntesen i de følsomme planter. Ukrudtsplanterne dør i spiringsfasen eller kort efter. Påvirkede ukrudtsplanter afbleges kraftigt.

Vinterraps. Umiddelbart efter såning sprøjtes der med 0,33 l/ha af Agro Bizz Clomazon CS. På let sandjord (JB 1 – 2) reduceres doseringen til 0,25 l/ha. Der må højst gå 3 dage fra såning til sprøjtning, senere sprøjtning kan afbøde afgrøden meget. Rapsen må ikke være fremspiret når der sprøjtes. Agro Bizz Clomazon CS sprøjtes direkte ud på jorden. Den bedste virkning opnås ved en jævn jordoverflade med en god jordfugtighed. Ved sprøjtning på tør jord vil Agro Bizz Clomazon CS forblive stabil og virkningen af midlet vil komme når jorden bliver fugtig. Rapsen skal være sået ensartet i dybden og dækket af mindst 2 cm. jord.

Kartofler. Der skal bruges 0,25 l/ha af Agro Bizz Clomazon CS, der må ikke sprøjtes senere end 5 dage før kartoflernes gennembrydning, og kartoflerne må ikke være fremspiret når der sprøjtes. Den bedste virkning opnås med en fast og fugtig kam der har "sat" sig lidt. Kartoflerne skal være lagt i ensartet dybde og dækket af jord. Radrensning, nedvanding af kammen og andet der påvirker det øverste jordlag skal helst undgås efter sprøjtningen da det kan reducere effekten. Umiddelbart efter kartoflernes gennembrydning kan der spredt forekomme forbigående afblegning af kartoflernes blade. Afblegningen forsvinder normalt hurtigt og har ingen effekt på afgørdeudbyttet.

Ærter og gulerødder. Der skal bruges 0,25 l/ha af Agro Bizz Clomazon CS, der må ikke sprøjtes senere end 5 dage og helst op til 10 dage før afgrødens fremspiring. Ved senere sprøjtning risikerer man misfarvede blade på afgrøden. Et jævnt såbed uden knolde og med en god jordfugtighed giver den bedste virkning. Agro Bizz Clomazon CS anbefales ikke til humusholdige jorder, da virkning her vil være nedsat.

Sprøjteteknik: Der skal bruges 150 – 200 liter vand pr. ha i almindelige sprøjter.

Dyse:	Vand:	Tryk:	Hastighed:
ISO F/LD 110-02	160 l/ha	3,0 bar	6,0 km/t
ISO F/LD 110-025	200 l/ha	3,0 bar	6,0 km/t

Andre tryk og dyser kan anvendes, se sprøjtens manual samt forskellige tabeller. Hvis der er fare for afdrift af sprøjtevæsken bruges LD (= Low Drift) dyser. God jordfugtighed ved sprøjtningen og dagene efter vil øge effekten af midlet.

Tilberedning af sprøjtevæsken: Start altid med en ren sprøjte. Fyld sprøjten 3/4 op med vand, start omrøreren og hæld den beregnede mængde Agro Bizz Clomazon CS i sprøjten, fyld op med vand. Lad omrøreren køre indtil sprøjtningen er afsluttet. Den opblandede sprøjtevæske skal udsprøjtes med det samme. Påfyldning af koncentreret sprøjtevæske må kun ske på befæstet vaskeplads eller på det areal der ønskes behandlet, og der skal bruges præparat-fyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Afstandskrav: Vaskeplads 50 m fra almen vandforsyning til drikkevandsformål og vandmiljø (vandløb, søer og kyster) og § 3-naturbeskyttelsesområder. 25 m fra ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål og drænsystemers rense- og samlebrønde samt 50 m fra vandmiljø Ved påfyldning i marken skal der være mindst 300 m til almen og ikke-almen vandforsyning til drikkevandsformål og 50 m til vandmiljøer og drænsystemers rense- og samlebrønde Der skal vælges et nyt sted ved hver påfyldning og vask, når det sker på marken der behandles. Sker påfyldning i marken, medbringes der tilstrækkeligt vand i vandtank, sådan at påfyldning via præparatfyldeudstyret kan ske uden stop. Der må ikke på noget tidspunkt være risiko for tilbageløb til vandforsyning, og tappestederne skal være forsynet med udstyr der forhindrer overløb ved fyldning af tanken. Der må ved påfyldning af sprøjter ikke være direkte kontakt mellem vandslange monteret på tappstedet og væsken i sprøjten.

Blanding med andre midler: Agro Bizz Clomazon CS kan blandes med Boxer, Fenix og Glyphosat midler. Læs altid brugsanvisningen for en blandingspartner især mht. afstand til vandmiljøer. Blandingspartneren skal være helt opløst i sprøjten før Agro Bizz Clomazon CS tilsættes.

Rengøring af sprøjten: Efter sprøjtningen skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (den maksimale dosering må ikke overskrides). Rengør med et egnet rensmiddel, kontroller og rens evt. filtre, slanger og dyser. Der henvises i øvrigt til Miljøministeriets BEK nr. 268 af 31/03/2009 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter.

Bortskaffelse af tom emballage: Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyll vandet hældes op i sprøjtevæsken.

Omsåning: Ved udvintring af vinterraps behandlet med Agro Bizz Clomazon CS kan der om foråret sås korn, ærter, majs, kartofler, vårraps, gulerødder og løg, marken skal pløjes først.

Opbevaring: Tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Etiket nr.: I
GODKENDT

24 AUG. 2010

for pakninger på 1,3 + 5 liter
Miljøstyrelsen