



AGROS BROMOX

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vår- og vintersæd samt frøgræs.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-59

Analyse: Bromoxynil 240 g/l (20,5%)

loxynil 160 g/l (13,7%)

Indeholder Solventnaphta (råolie) tung aromatisk

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr 242 af 13 marts 2011 om bekæmpelsesmidler, jf. § 60-61 i bekendtgørelse nr 702 af 24 juni 2011 om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Formulering: Flydende

Emballage:

5 liter

ADVARSEL

Før at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse. R 65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R63 Mulighed for skade på barnet under graviditet. R36/38 Irriterer øjnene og huden. R67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed. R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå indånding af aerosoltåger. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Vask alle personlige værnemidler efter brug. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vår- og vintersæd samt frøgræs. Må i korn ikke behandles senere end i vækststadiet 31 og i frøgræs ikke senere end 90 dage før høst. Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloak afløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Miljøfarlig



Sundhedsskadelig

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Indånding:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

Indtagelse:

Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Ro, frisk luft og søg omgående lægehjælp.

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Brugsanvisning Agros Bromox

Generelt

Agros Bromox er primært et kontaktmiddel til bekæmpelse af 2-kimbladet ukrudt i vår og vintersæd. Det anvendes forår og efterår. Produktet må kun anvendes 1 gang årligt.

Afgrøder, formål, dosering og sprøjtetidspunkt

Skadegører	Vårsæd med og uden græsudlæg til foder		Frøgræs af rajgræs udlagt i renbestand efterår
	Småt ukrudt	Ukrudt op til 2 løvblade	Ukrudt op til 2 løvblade
Agerkål, Agersennep, Haremad, Hvidmelet gåsefod, Hyrdetaske, Kornblomst, Pengeurt, Svinemælde, Bleg og fersken pileurt, Kamille, Tvetand, Ærenpris	0,5 l Bromox	0,5 l Bromox + 1 tablet Express	0,3 l Bromox + 1 tablet Express
Hundepersille, Fuglegræs, Forglemmigej, Kornvalmue, Snerle pileurt	0,5 l Bromox	0,5 l Bromox + 1 tablet Express	0,5 l Bromox + 1 tablet Express
Ager stedmoder, Amsinkia, Svinemælk	0,5 l Bromox		
Burresnerre, Hanekro, Krumhals, Spergel, Vejpileurt	0,4 l Bromox + 0,4 l Flurostar		
Gul okseøjle		0,5 l Bromox + 2 tab Express	0,5 l Bromox + 1 tablet Express

Tilberedning af sprøjtøveske

Fyld tanken med 3/4 af den væskemængde, der skal bruges. Sørg for omrøring under tilsætningen af Agros Bromox. Derefter tilsættes eventuelle blandingspartnerne. Til sidst tilsættes resten af vandet og eventuel olie. Sørg for god omrøring indtil væsken er udspøjtet.

Rengøring af sprøjtøvestyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldødstyr:

Restsprøjtøvesken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldødstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtøvesken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, smat skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

Lagring

Agros Bromox skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Skadegører	Vintersæd forår		Vintersæd efterår	
	Ukrudt 2-4 løvblade	Ukrudt 4-5 løvblade	Ukrudt kimblade	Ukrudt 2-4 løvblade
Agerkål, Agersennep, Hyrdetaske, Ærenpris, Kornblomst, Kamille, Fuglegræs, Tvetand, Forglemmigej, Valmue	0,5 l Bromox + 1 tablet Express	0,5 l Bromox + 1 tablet Express	0,5 Bromox	0,5 Bromox
Ager stedmoder	0,5 l Bromox + 1,5 tab Express	0,5 Bromox + 1,5 tablet Express		
Burresnerre	0,5 l Bromox+ 0,5 l Fluroxypr	0,5 l Bromox+ 0,6 l Fluroxypr	0,3 l Bromox + 1,2 l Stomp P	0,5 l Bromox + 1,2 l Stomp P
enårig rapgræs				
Enårig rapgræs, Vindaks			0,5 l Bromox + 2,0 l Fidox	0,5 l Bromox + 3,0 l Fidox

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjtøvestyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar

Sprøjteteknik			
Dyse	Bar	Km/time	
ISO-020- Gul	3	6,4	150
ISO-025- Lilla	3	6,1	185

Klima

Agros Bromox virker bedst ved høj luftfugtighed og temperaturer over 2°C. Kornet skal være sundt og i god vækst. Det frarådes at behandle ved udsigt til nattefrost. Der skal være tørvej i mindst 1 time efter en behandling.

Tankblanding

Agros Bromox kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtøvesken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for skader og følgeskader som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.