



AGROS DIQUAT

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-84

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Analyse: 374 g/l (31,8% w/w) diquat dibromid, svarende til 200 g/l diquat
Formulering: Flydende

Emballage:

5 liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R 48/25: Giftig Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

R38: Irriterer huden.

R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå kontakt med huden.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen.

Ukrudtsbekæmpelse:

Må i kartofler ikke anvendes senere end stadie 14.

Må i frugttræer og frugtbuske ikke anvendes senere end stadie 80.

Må i jordbær ikke anvendes senere end stadie 93.

Må i sukkerroe, rødbe, gulerod, pastinak, persillerod, kålroe, majroe, radise, såløg, forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli, blomkål, hovedkål, savojkål, rosenkål, kinakål, grønkål, spinat, kørvel, persille, dild, timian, friske ærter og bønner med og uden bælg, suktermajs, knoldselleri, blegselleri, salat, asparges, sætteløg, skalotteløg, hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod ikke anvendes senere end stadie 07

Må i valmuer, rødkløver og kommen ikke behandles senere end 75 dage før høst.

Nedvisning:

Ved nedvisning af kartofler må der ikke behandles senere end 7 dage før høst og kartoffeltoppen må ikke anvendes til foder.

Nedvisning af ærter til modenhed, raps og rygs. Må ikke behandles senere end 7 dage før høst.

Må i frøafgrøderne rødkløver, hvidkløver, sneglebælg, kinakål, hvidkål, rødkål, pak choi, karse, rucola og skorzoner ikke anvendes senere end stadie 89.

Ved nedvisning af frøafgrøder må behandlede afgrøder, halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes i andre afgrøder end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb søer o.l.).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Tom emballage må ikke genanvendes



Miljøfarlig



Giftig

Bifare



Farlig

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Indånding:

Hudkontakt:

Øjenkontakt:

Indtagelse:

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Ro, frisk luft og lægehjælp.

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Etikette nr. 1
GODKENDT

13 DEC. 2010

for pakninger på 5L
Miljøstyrelsen

Brugsanvisning Agros Diquat

Generelt

Agros Diquat er et kontaktmiddel, som virker på planternes grønne dele. Der er kun begrænset transport rundt i planten.

Afgrøder, sygdom, dosering og sprøjtedidspunkt

Afgrøde	Formål	Dosering l/ha	Tidspunkt og bemærkninger
Kartofler BBCH 43-49	Nedvisning **	1,5-2,5	Nedvisning når knoldene har ønsket størrelse eller ved konstateret skimmelangreb eller i læggekartofler ved risiko for virusoverførelse med bladlus. Max 2 behandlinger med 5-8 dages interval. Ved kraftig grøn top: 2 x 2,5 l/ha. Kartofler ved begyndende afmodning: 1 x 2,5 l/ha eller split 1,5 + 1,0 l/ha. Optagning efter ca. 14 dage.
Frø af radise, purøg, rødkløver, hvidkløver, snelebbæg, kinakål, hvødkål, rødkål, pak choi, karse, rucola BBCH 55-89	Nedvisning *	2,0-2,5 S	Max 1 behandling.
Ærter BBCH 67-69	Nedvisning *	2,5	Behandles 7-10 dage før høst. Kan også bruges til fremvisærter.
Raps og ryp BBCH 66-67	Nedvisning *	2,5 S	Behandles et par dage efter normal skårlægningstidspunkt. Der høstes derefter direkte på rod 7-14 dage efter sprøjtning.
Rød og hvidkløver med udlæg af engrasgræs, Hvøns, Kommen	Ukrudts- bekæmpelse *	2,0 S	Behandles i december- februar når væksten er standset efter en frostperiode. Tilsæt ikke spredte klæbemiddel i svage engrasgræsmarker.
Valmuer BBCH 12-16	Ukrudts- bekæmpelse **	1,0-2,0	Valmuer tåler Agros diquat efter fremspiring, sprøjtning kan tidligst ske når valmuen har blivende blade. Behandling kan gentages når valmuen har 4-6 blade.
Kartofler BBCH 00-14	Ukrudts- bekæmpelse *	1,0-2,5 S	Behandles senest når 10 % af kartoflerne er fremspirat.
Frugltræer og buske BBCH 10-80	Ukrudts- bekæmpelse *	2,0-2,5 S	Sprøjtningen udføres som afskærmet sprøjtning, så ønskede planter ikke rammes.
Jordbær BBCH 91-93	Ukrudts- bekæmpelse *	2,0-2,5 S	Sprøjtningen udføres som afskærmet sprøjtning, så ønskede planter ikke rammes. Den udføres efter høst.
Sukkerroe, radbede, gulerod, pastinak, persillerod, kålroe, majroe, radise, såløg, forårsløg, purøg, porre, fennikel, broccoli, blomkål, hovedkål, savojkål, rosenkål, krus-kål, grønkål, spinat, kørvel, persille, dild, timian, friske ærter og bønner m/u bælg, sukkermais, knoldselleri, blegselleri, salat, asparges BBCH 00-07	Ukrudts- bekæmpelse *	1,0-2,0 S	Der skal sprøjtes før afgrøden spirer frem. Såbedet gøres klar og såning afventer ukrudtets fremspiring.
Sætleøg, skalotteløg, hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod BBCH 00-07	Ukrudts- bekæmpelse *	1,0-2,0 S	Der skal sprøjtes før afgrøden spirer frem.
Sårkulturer af nåletræer, løvfældende træer og buske BBCH 00-07	Ukrudts- bekæmpelse *	1,0-2,5 S	Der skal sprøjtes før afgrøden spirer frem.
Priklebede/udplantede bede af nåletræer, løvfældende træer og buske	Ukrudts- bekæmpelse *	1,0-2,5 S	Sprøjtningen udføres som afskærmet sprøjtning, så ønskede planter ikke rammes.

S = Tilsæt 0,1% spredte-klæbemiddel.

* Max 1 behandling

** Max 2 behandlinger

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjtestyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 400 liter per hektar. Brug lowdrift dyser, hvis der er risiko for afdrift.

Sprøjteteknik			
Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-F-02-110 Gul	3	6,5	150
ISO-F-025-110 Lilla	3	5,0	240
ISO-F-04-110 Rød	3	5,0	384

Optimale virkningsforhold

Agros diquat er regnfast efter 10 minutter. Der bør ikke sprøjtes på frose planter. Klart vejr giver hurtigere virkning. Sprøjt helst om morgenen. Tørkestressede planter bør ikke sprøjtes, da risikoen for navlenekrose øges.

Tankblanding

Agros diquat kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje. Tankblandingen skal udsprøjtes straks.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjtten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjtten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjtten og tilsæt et egnet rensemiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal. Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring

Agros diquat skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage under lås og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.