



# AGROS ETHOFUMESAT

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3 år

med maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat.

## DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-62

Analyse: Ethofumesat 500 g/l (45%)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om  
bekæmpelsesmidler

Formulering: Flydende

Emballage: **1 liter**

### ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. R52/53: Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbogsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3 år med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (søer, vandløb mm) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå forurening af vandmiljøet med produkter eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakfløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

## Brugsanvisning

### Generelt

Agros Ethofumesat er primært et middel til bekæmpelse af 2-kimbladet ukrudt i bederoer. Det indgår i et sprøjteprogram sammen med en række andre produkter. Produktet anvendes generelt for at øge effekten overfor bl.a. fuglegræs, burresnerre og pileurter.

### Dosering og sprøjetidspunkt

Agros Ethofumesat indgår i et sprøjteprogram sammen med en række andre produkter, hvor sprøjteprogrammet tilpasses den enkelte mark.

Ukrudtsarter	Ukrudt på kimbladsstadiet	Nyt ukrudt fremspiret	Nyt ukrudt fremspiret
		6-8 dage senere	7-14 dage senere
2-kim bladede arter	1,5 – 2,0 l/ha Betanal + Goltix + Safari	0,07 l/ha Agros Ethofumesat + 1,5 – 2,0 l/ha Betanal + Goltix + Safari	0,07 l/ha Agros Ethofumesat + 1,5-2,0 l Betanal + Goltix + Safari

Den maksimale dosering af Agros Ethofumesat er 0,14 liter/ha hvert 3. år. Der er også mængdemæssige restriktioner for anvendelsen af Betanal, Safari og Goltix.

Der tilsættes olie ud fra lufttemperaturen

Temperatur	Dosering
Under 15°C	0,5 liter/ha
15- 20°C	0,2 liter/ha
Over 20°C	Undlades

### Sprøjeteknik

Det er vigtigt, at sprøjtestyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtingen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar

Sprøjeteknik			
Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-020- Gul	3	6,4	150
ISO-025- Lilla	3	6,1	200

### Resistens

Gentagen anvendelse af midler med samme virkningsmekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det at skifte mellem midler med forskellig virkningsmekanisme eller anvende en tankblanding af midler med forskellige virkningsmekanismer, som begge er aktive over for de aktuelle ukrudtsarter.

### Klima

Ethofumesat virker bedst ved høj luftfugtighed og temperaturer over 12°C. Roerne skal være sunde og i god vækst, Det frarådes at behandle ved lave temperaturer og ved udsigt til nattefrost. Der skal være tørvej i mindst 4 timer efter en behandling.

### Tankblanding

Ethofumesat kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje. Bland ikke med græsmidler. Der bør være mindst 1 uge mellem 2 sprøjtinger.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken med 3/4 af den væskemængde, der skal bruges. Sørg for kraftig omrøring under tilsætningen af Ethofumesat. Derefter tilsættes eventuelle blandingspartnere.

Til sidst tilsættes resten af vandet og eventuel olie. Sørg for god omrøring indtil væsken er udsprøjt.

### Renngøring af sprøjtemateriel

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes med mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimalt tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau.

2. Straks efter sprøjting skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den behandlede afgrøde.

3. Fyld tanken med ca.10% af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankpule-dyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den behandlede afgrøde.

4. Dyser og sier afmonteres og renses med rent vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.

5. Sprøjten fyldes igen med ca. 10% af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankpule-dyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal. Vask af marksprøjter og traktor eller rygsprøjte, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor produktet er blevet udbragt. Et areal, der anvendes til vask, må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjtestyr eller traktor skal placeres på behandlet areal, på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

### Lagring

Agros Ethofumesat skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

### Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

### Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssigt brug eller opbevaring.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.

### Førstehjælp:

#### Generelle anvisninger:

Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

#### Indånding:

Rø, frisk luft og lægehjælp.

#### Hudkontakt:

Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

#### Øjenkontakt:

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.

#### Indtagelse:

Skyll munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.