



# AGROS FLUDIOXONIL 100

## Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdning af læggekartofler  
indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs ved lægning.

### DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-97

Analyse: Fludioxonil 100 g/l (9,3%wwv)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler  
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Batchnummer: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdato.

Midlet er et suspensionskoncentrat til bejdning

Formulering: Flydende 5 liter

Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Emballage:

# 5 liter

### ADVARSEL

**For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.**

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til bejdning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs ved lægning.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.**

**Må ikke tømmes i kloakfløb.**

**Ved indendørs bejdning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdningen opbevares i en veldefineret afgrænset enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse. Ved sortering af læggekartofler skal disse umiddelbart efter bejdningen emballeres i sække/poser og plomberes.**

**Læggekartoflerne er bejdsset med Agros Fludioxonil 100 indeholdende Fludioxonil. Kartofflerne er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.**

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. Opbevares utilgængeligt for børn.

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**



Miljøfarlig

### Førstehjælp:

**Generelle anvisninger:**

**Indånding:**

**Hudkontakt:**

**Øjenkontakt:**

**Indtagelse:**

Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten Ro, frisk luft og lægehjælp.

Kommer stoffet på huden, vaskes straks med store mængder vand.

Kommer stoffet i øjnene, fjern eventuelle kontaktlinser, skyl straks grundigt med vand og kontakt læge

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

# Brugsanvisning Agros Fludioxonil 100

## Generelt

Agros Fludioxonil 100 må kun bruges til bejdning af læggekartofler. Det må kun bruges indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs ved lægning.

### Resistens

Fludioxonil har FRAC kode 12. Fludioxonil tilhører gruppen af phenylpyrroler. Der er lav risiko for udvikling af resistens og der er ingen krydsresistens til andre kemiske grupper. For at modvirke resistensdannelse, anbefales det med jævne mellemrum at skifte mellem bejdsemidler med forskellig virkemekanisme.

### Skadegørere, dosering og bemærkninger

Skadegører	Dosering
Rodfiltsvamp ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	250 ml/ton kartofler
Rodfiltsvamp ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	25 ml/100 kg kartofler

### Sprøjteteknik

Der anvendes en vandlig opslæmning, som udsprøjtes på knoldene. Sprøjtetanken fyldes halvt med vand og Agros Fludioxonil 100 tilsættes under omrøring. Sprøjtévæsken skal anvendes umiddelbart efter blanding.

### Bejdning indendørs på rullebord i sprøjtchamber

Applikationsvolumen: 1,0 liter pr. ton. (250 ml Agros Fludioxonil 100 + 750 ml vand).

Sprøjtetågen dannes af en rotationskive, som fordeler bejdsemidlet på knoldene når de passerer over et rullebord.

### Bejdning under læggemaskinen

Applikationsvolumen: 30-40 liter pr. ton (250 ml Agros Fludioxonil 100 + 30-40 liter vand).

Læggekartoflerne sprøjtes med to modsat stillede dyser pr. sårække under det frie fald fra læggemaskinen mod såfuren. Anvendelse af bejdning under læggemaskinen har ikke vist særlig god virkning. Den bedste effekt opnås ved bejdning indendørs på rullebord. Uanset bejdsemetode skal slanger og dyser gennemskylles dagligt efter endt brug.

### Spild og rengøring

Ved spild på jord fjernes kraftigt forurenede jordlag. Ved spild på gulv blandes med sand, jord eller andet ikke reaktivt adsorberende materiale. Indendørs forurenede område rengøres grundigt med sæbe og vand. Udslip til afløb forhindres. Opsamlet forurenede materiale opbevares i lukkede beholdere. Opsamlet materiale er farligt affald, som bortskaffes gennem den kommunale affaldsordning for farligt affald.

### Mærkning af bejdsset

Ved indendørs bejdning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdningen opbevares i en veldefineret afgrænset enhed og mærkes tydeligt med nedenstående indrammede angivelse. Ved sortering af læggekartofler skal disse straks emballeres i sække/poser og plomberes. Følgende skal fremgå af enten plantepas eller emballage:

**De bejdsede læggekartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde og foder**

### Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllenvandet hældes op i sprøjtévæsken / forbruges i bejdseanlægget. Emballagen må ikke genbruges.

### Optimale virkningsforhold

Agros Fludioxonil 100 er et kontaktmiddel. For at opnå god effekt er det afgørende, at midlet doseres korrekt og fordeles jævnt på knoldene. Knoldene skal være fri for jord. Der skal anvendes sundt læggemateriale med god spireevne og grokraft og uden mekaniske skader, bakterie- eller virusangreb. Undgå at beskadige knoldene i forbindelse med lægning og forsortering, da dette kan medføre bakterieinfektion. Lægning af knolde under ugunstige fremspiringsforhold (kold og våd jord) frarådes. Agros Fludioxonil 100 må ikke anvendes til knolde, der lægges under sådanne forhold.

### Opbevaring

Produkter som opbevares i mere end seks måneder skal omrøres. Produktet bibeholder sin effektivitet under hele opbevaringsperioden eller i mindst to år.

### Lagring

Agros Fludioxonil 100 skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

### Bemærk

Agros fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssigt brug eller opbevaring af produktet.