



AGROS METAMITRON

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer med maksimalt 3,0 l/ha pr år
(3 x 1,0 l/ha pr år eller 4 x 0,75 l/ha pr år)

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 650-25

Aktivstof: Metamitron

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
om bekæmpelsesmidler

Koncentration: 700 g/l (57,9%)

Formulering: Flydende

Emballage:

5 Liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R 22: Farlig ved indtagelse. R51: Giftigt for organismer, der lever i vand. R53: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: **Må kun anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer med maksimalt 3,0 l/ha pr år (3 x 1,0 l/ha pr. år eller 4 x 0,75 l/ha pr. år). Brugsanvisningens dosering-sangivelser må ikke overskrides.**

Må i bederoer ikke anvendes senere end 105 dage før høst. Der må uden begrænsninger plantes/sås bederoer/rødbeder efter bederoer. For alle andre afgrøder må der ikke sås/plantes før tidligst 6 uger (42 dage) efter sidste behandling med metamitron. Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (søer og vandløb mm.) Undgå forurening af vandmiljøet med produkter eller beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. **Opbevares utilgængeligt for børn.**

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Xn



Sundhedsskadelig

N



Miljøfarlig

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding: Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt: Kommer midlet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Brugsanvisning Agros Metamitron

Generelt

Agros Metamitron anvendes til bekæmpelse af 2-kimbladet frøukrudt i bederoer. Midlet har både blad- og jordefekt og anvendes i et sprøjteprogram med andre herbicider.

Afgroeder, skadegører, dosering og sprøjetidspunkt

Generelt skal der sprøjtes på nyfremspiret ukrudt for at opnå den bedste effekt. Der bør som regel udføres 3 behandlinger med maksimalt 1 l/ha pr behandling, alternativ er 4 behandlinger med 0,75 l/ha pr behandling.

Når dagtemperaturen er under 22°C, bør der tilsættes olie.

Temperatur	Penetreringsolie	Superolie
10 – 15 °C	2,0 l/ha	0,5 l/ha
15 – 22 °C	1,0 l/ha	0,25 l/ha
Over 22 °C	Ingen	Ingen

Første sprøjtning udføres på kimbladsstadiet og 2. sprøjtning 5-7 dage senere. Tredje og eventuelt fjerde sprøjtning udføres 7-10 dage efter den forudgående sprøjtning. For at opnå den bredeste effekt skal Agros Metamitron blandes med andre midler, som har effekt overfor bredbladet ukrudt.

Sprøjeteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 200 liter pr ha. Anvend lowdrift dyser hvor der er risiko for adrift til naboafgrøder, søer eller vandløb. Anvend ikke under 150 l/ha under tørre forhold.

Sprøjeteknik			
Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-F-02-110 Gul	3	6,4	150
ISO-F-025-110 Lilla	3	6,1	200

Forhold der påvirker effekten

Bedst virkning opnås ved høj luftfugtighed og temperaturer over 15°C. Det er meget vigtigt at behandle når ukrudtsplanterne har det rette udviklingsstrin.

Høj jordfugtighed fremmer jordvirkningen. Under tørre forhold sprøjtes ofte 4 gange. Ved kraftig sol og høje temperaturer bør behandlingen udsættes til sidst på dagen. Der må ikke sprøjtes ved udsigt til nattefrost, og efter frost ventes 3-4 dage.

Omsåning

Der kan uden problemer omsås med roer. Efter en pløjning og 6 ugers ventetid efter sidste behandling kan der dyrkes kartofler, majs og hestebønner.

Afstand til andre sprøjtninger

Efter anvendelse af kvikmidler, bør der gå 5 dage inden behandling foretages med Agros Metamitron og ligeledes skal roerne komme sig over en Agros Metamitron behandling inden der anvendes et kvikmiddel.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sprøjetanken fyldes 1/2 med vand, og Agros Metamitron omrystes kraftigt og tilsættes under omrøring mens tanken fyldes op til ¾ med vand, herefter tilsættes olie og eventuel blandingspartner

Tankblanding

Agros Metamitron kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlings-tidspunktet. Blanding med visse insektmidler kan øge Agros Metamitron's aggressivitet over for roerne, benyt derfor kun insektmidler hvor producenten tager ansvar for blandingen. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjeten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjeten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjeten og tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal. Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring

Agros Metamitron skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Rester og bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros fralægger sig alt ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Vejlrig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.