

Brugsanvisning Riza

Generelt

Riza optages hurtigt af planten. Der ses normalt ikke svidninger i afgrøden, sprøjt dog ikke i meget varmt vejr eller frostvejr. Virker i 2-4 uger afhængig af dosering

Afgrøder, skadegører, dosering og sprøjtetidspunkt

Afgrøde	Dosis	Skadegører	Tidspunkt
Hvede	0,5 – 1,0 liter/ha	Gulrust, Brunrust, Meldug, Hvedebrunplet, Hvedegråplet(*) Aksfusarium	Ved første symptomer. Sprøjtes ved begyndende angreb eller Efter risikovurdering. Stadio 30-71 Mellem stadio 61 og 69
Byg	0,5 – 1,0 liter/ha	Bygrust, Bygbladplet, Skoldplet, Meldug	Sprøjtes ved begyndende angreb Stadio 30-65
Rug	0,5 – 1,0 liter/ha	Brunrust, Skoldplet, Meldug	Sprøjtes ved begyndende angreb Stadio 30-65
Triticale	0,5 – 1,0 liter/ha	Brunrust, Gulrust, Meldug, Skoldplet, Hvedebrunplet, Hvedegråplet	Sprøjtes ved begyndende angreb Stadio 30-59. Mod gråplet og brunplet sprøjtes i stadio 30-59
Raps	1,0 liter/ha	St knoldbægersvamp, Gråskimmel, Skulpesvamp	Behandl i stadio 65 mod knoldbægersvamp og gråskimmel. Mod skulpesvamp behandles i stadio 51-59

(*) På grund af resistensudvikling kan kun forventes moderat effekt på hvedegråplet.

Der må maksimalt behandles 2 gange årligt. Laveste dosering ved tidlig sprøjtning i forhold til sygdommens udvikling.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 250 liter pr ha

Sprøjteteknik			
Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-F-02-110 Gul	3	6,4	150
ISO-F-025-110 Lilla	3	6,1	200
ISO-F-03-110 Blå	3	6,7	250

Tankblanding

Riza kan blandes med de mest gængse produkter, som bruges på behandlingstidspunktet. Læs altid blandingspartnerens brugsanvisning nøje. Bland ikke med mangansulfat men brug mangannitrat.

Resistens

Resistens kan opstå ved gentagen brug af midler med

samme virkningsmekanisme. Brug derfor produkter men en anden virkningsmekanisme med jævne mellemrum. Brug også anbefalet dosering på et tidligt tidspunkt i svampens udvikling.

Rengøring af sprøjtemateriel

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Sprøjten skylles grundigt med rent vand. Skyllevandet udsprøjtes på et allerede behandlet areal. Fyld 100-200 liter vand i sprøjten og tilsæt et egnet rensmiddel. Lad omrøringen køre ca. 15 minutter og sprøjt derefter skyllevandet ud på et allerede behandlet areal.

Skyl efter med rent vand, som udsprøjtes på det allerede behandlede areal.

Lagring

Riza skal opbevares frostfrit i uåbnet og ubeskadiget originalemballage beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes.

Bemærk

Agros er ikke ansvarlig for produktets sammensætning, herunder mængden af aktivstof, da produktet er parallelimporteret og solgt videre i originalemballage. Agros fralægger sig alt ansvar for produktets effekt, herunder skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssigt brug eller opbevaring. Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.



RIZA

Svampemiddel

Må kun anvendes til svampe-bekæmpelse i korn og raps.

DEKLARATION

Svampemiddel nr.: 650-17

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

Aktivstof: Tebuconazol

Koncentration: 250 g/l (26% w/w)

Formulering: Flydende

Emballage:
5 liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R36/R38 Irriterer øjnene og huden.

R63: Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

R51/53: Giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj.

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovgivtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må ikke anvendes til svampebekæmpelse i korn og raps.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end vækststadio 69 og ikke senere end 5 uger før høst. Maksimalt 2 behandlinger om året.

Må i byg og havre ikke anvendes senere end vækststadio 65 og ikke senere end 6 uger før høst. Maksimalt 2 behandlinger om året.

Må i raps ikke anvendes senere end vækststadio 69. Maksimalt 2 behandlinger om året.

Må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakfløb

Opbevares utilgængeligt for børn.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger: Aftag forurenede tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding: Ro, frisk luft og lægehjælp.

Hudkontakt: Vask grundigt med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Registreringsindehaver: Agros, Jernbanegade 27, 6000 Kolding • tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk

Xn



Sundhedsskadelig

N



Miljøfarlig