

eller sammen med udsortering i lagerhus. Slang og dyser skylles igennem hver dag efter endt bejdning, for at hindre at midlet storkner og derved tilstopper dyserne.

Bejdseteknik

Til bejdning anvendes et specielt anlæg – enten monteret på kartoffellæggeren, eller et dertil indrettet rullebord med ULV sprøjtestyr. Nedenstående forhold skal tages i betragtning ved bejdning med Amigo FS 350.

"Harditeknik"

Der anvendes 60 – 80 ltr vand/ha. Kartoflerne oversprøjtes under det frie fald fra læggeren mod jorden. Udsprøjtningen foregår med specialudstyr, (Hardi), påmonteret læggeren. Der monteres to dyser pr. række med en indbyrdes afstand på 25 cm. Dyserne indstilles således, at kartoflerne rammes fra 2 forskellige sider.

Dyserne skal pege skråt nedad i vinkler på henholdsvis 25° og 35°. Det er vigtigt, at dyserne indstilles, så de ikke befugter læggekederne, da det kan medføre øget smitrisiko af sortbensyge. Slang og dyser skylles igennem hver dag efter endt bejdning, for at hindre at midlet storkner og derved tilstopper dyserne. Bejdning af forspirede kartofler er også mulig.

Føks udbragt med:

Rækkeafstand	Dysenummer	Km/t	Tryk	Ltr/ha
0,75 mtr	2x1299-8	6	2,5	70 ltr/ha
0,80 mtr	2x1299-8	6	2,9	70 ltr/ha
0,75 mtr	2x1299-8	7	3,4	70 ltr/ha
0,75 mtr	2x1299-8	7	3,9	70 ltr/ha

"Viby-teknik"

Anvend så lav væskemængde som muligt – anvend 2 – 4 ltr/ tons kartofler. Sørg for at dyserne er monteret ca. 20 cm fra læggekedden, således at væsken ikke rammer denne.

Rullebord

Anvend 0,6 – 1,0 ltr færdigblandet væske/tons kartofler. Sørg for at kartoflerne er uden jord. Efter bejdning må kartoflerne ikke lagres direkte i storsække, men skal opbevares i kasser for at sikre en hurtig tørring, eller lægges direkte efter bejdning.

Virkningsforhold

Beskyttelse mod insekter sker ved optagelse af imidacloprid gennem den spirende kartoffels rodsystem. Virkestoffet transporteres med saftstrømmen opad mod vækstpunkterne i stængel og blade. Den systemiske virkemåde hos insektmidlet, gør Amigo FS 350 i stand til at beskytte kartoflerne mod insekter i den første vigtige del af vækstperioden.

Bemærk

- Amigo FS 350 bør kun anvendes på sundt lægge materiale (uden mekaniske skader, bakterievampe- eller virusangreb og med god spireevne og grokraft).
- For bl.a. at undgå bakterieinfektion, skal det sikres, at kartoflerne ikke skades eller bliver våde i forbindelse med bejdning. (Viby/rullebord).
- Hvis lægning sker under forhold, der forsinket fremspiringen (koldt, vådt og/eller dybt), kan bejdningen yderligere forsinke fremspiringen under sådanne højrisiko forhold. Under sådanne betingelser bør der ikke bejdses.
- Anvendes der indendørs bejdning, skal det sikres at kartoflerne tørres forsvarligt straks efter bejdning, og inden videre opbevaring.

Resistens

Insekter kan udvikle nedsat følsomhed eller resistens mod midlet. Reduceret eller manglende virkning, som følge heraf, kan ikke forudsiges i de enkelte tilfælde. Vi hæfter ikke for tab, der kan opstå på denne måde. Amigo FS 350 tilhører gruppen af neonicotinoide. For at forebygge resistens bør der ikke i en afgrøde der er bejdsset med Amigo FS 350 anvendes insektmidler fra samme middel gruppe for eksempel Mospilan.

Tankblanding

Amigo FS 350 kan blandes med Monceren FS 250.

Fremstilling af sprøjtevæsk

Ved rullebord og Vibyanlæg fyldes den afmålte mængde vand i beholderen, og Amigo FS 350 hældes i under omrøring. Ved Hardianlæg fyldes sprøjetanken halvt med vand, og Amigo FS 350 tilsættes under omrøring. Sprøjtevæsken udsprøjtes umiddelbart efter tilberedningen.

Ansvar

Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Rester og tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllvandet hældes op i bejdsevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Insektmiddel nr. 18-543

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse

Imidacloprid 350 g/l (30,84% w/w)
Indeholder 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, i blanding med 2-methyl-3(2H)-isothiazolone.
Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

Netto 5 liter

Flydende

Midlet er et suspensionspræparat til bejdning.

Fabr. nr. og dato påtrykt emballagen.

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen.

® is a registered trademark of the Bayer Group



Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.cropscience.bayer.dk

Bayer CropScience

Etikette nr: 1
GODKENDT

18. februar 2015

for pakninger på 5L
Miljøstyrelsen



5 liter

Insektmiddel

Må kun anvendes til insektbekæmpelse ved bejdning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs i forbindelse med lægning.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

28-10-2014

Reg.nr. 18-543

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til insektbekæmpelse ved bejdning af læggekartofler indendørs i dertil egnede anlæg eller udendørs i forbindelse med lægning.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloakfløb.

Farlig for bier – der skal anvendes passende bejdse- og læggeudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.

Ved lægning skal de bejdsede kartofler dækkes med jord. Ikke dækkede kartofler skal opsamles.

Ved indendørs bejdning skal de bejdsede læggekartofler umiddelbart efter bejdningen opbevares i en veldefineret afgrænset enhed. Ved sortering af læggekartofler skal disse straks emballeres i sække/poser og plomberes.

De bejdsede kartofler er bejdsset med Amigo FS 350 som indeholder imidacloprid. De bejdsede kartofler er farlige og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Der skal anvendes passende bejdse- og læggeudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv. Ved lægning skal de bejdsede kartofler dækkes med jord. Ikke dækkede kartofler skal opsamles.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Indånding: Bring personen i frisk luft.

Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302+P352).

Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301+P312).

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

BRUGSANVISNING

Amigo FS 350 er et flydende bejdsemiddel til kartofler, der indeholder insektmidlet imidacloprid. Amigo FS 350 anvendes som vådbejdse ved påsprøjtning af læggekartoflerne under lægningen eller ved udsortering i lagerhus. Imidacloprid er et systemisk aktivstof, der virker som kontakt- og mavegift, og beskytter planterne mod angreb af bladlus og cikader.

Dosering

Maksimalt 15 ml Amigo FS 350 pr. 100 kg læggekartofler. Dette svarer til 0,34 ltr Amigo FS 350/ha, når der lægges 2,3 t læggekartofler/ha.

Maksimal dosering

Produkt	Maksimal dosering/år
Amigo FS 350	0,34 ltr/ha

Anvendelse

Bejdningen foretages i forbindelse med lægning af kartoflerne

