

ANTERGON[®] SG

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL. MÅ KUN ANVENDES TIL SPIREHÆMNING AF LØG.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

INDHOLD

Vækstreguleringsmiddel, nr. 1046-15.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:

Maleinhydrazid 600 g/kg (60 % w/w)
Midlet er et vandopløseligt granulat (SG)

Registrering:

UPL Holdings Coöperatief U.A.,
Claudius Prinsenlaan 144a, Blok A,
4818CP Breda, The Netherlands

Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdatoen som sammen med batchnummer findes på emballagen.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes til spirehæmning af løg og ikke senere end 2 uger før høst. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



BRUGSANVISNING

Antergon SG anvendes til at hindre spiring af løg under opbevaring. Der bør kun behandles løg som forventes opbevaret til det følgende kalenderår.

Anvendelse

Antergon SG udsprøjtes i tørt vejr uden udsigt til regn de første 10-12 timer. Der sprøjtes lige før løgbladene falder (ca. 10 % vætning) – dog senest 2 uger før høst.

Dosering

På en ensartet udviklet afgrøde på optimalt tidspunkt anvendes 3 kg i 2-300 l vand pr. ha. Hvis afgrøden er uensartet, eller det optimale tidspunkt er overskredet, anvendes 4 kg pr. ha.

Dyseforslag

Dysernr.	bar	km/t	l/ha
ISO 025	3	6,0	200

Anvend store dråber ved risiko for vinddrift.

Fyld beholderen $\frac{3}{4}$ med vand, tilsæt Antergon SG under omrøring og fyld op med vand. Påfyldning skal ske i marken eller på plads med opsamling. Restsprøjtevæsken skal fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede afgrøde.

For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave.

Opbevaring

Antergon SG skal opbevares tørt og køligt.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

© Reg. varemærke fra

Etiket nr.: 1

GODKENDT
af Miljøstyrelsen:
1. december 2023

For pakninger på:
5kg & 4x5kg

Franziska Sørensen

5 kg



UPL