



MAKHTESHIM
A G A N
BENELUX & NORDIC



Må kun bruges til bekæmpelse af spindemider i æbler, pærer, blommer og kirsebær samt i prydblplanter i væksthuss.



INSEKTMIDDEL

Deklaration: Insektmiddel, nr. 396-11

Analyse: Clofentezin 500 g/l (42,3%).
Flydende.

Væske: nettoindhold 1 L

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

FORSIGTIG

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun bruges til bekæmpelse af spindemider i æbler, pærer, blommer og kirsebær samt i prydblplanter i væksthuss. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i æble, pære, blomme og kirsebær ikke anvendes senere end grøn spids.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Godkendelsesindehaver:
Makhteshim - Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87,
NL-3832 GK Leusden, Holland
www.mabeno.com

Førstehjælp:

Generelt

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etiket eller leverandørbrugsanvisning.

Indånding

Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

Indtagelse

Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand. Personen holdes i ro, og der søges straks lægehjælp. Fremkald ikke opkastning.

Hudkontakt

Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe. Der søges læge ved fortsat hudirritation.

Øjenkontakt

Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning og søg læge.

BRUGSANVISNING

Afgrøder

Apollo® 50 SC kan anvendes til bekæmpelse af spindemider i frugttræer, samt prydblplanter i væksthuss.

Anvendelsesområde og virkningsspektrum

Apollo® 50 SC anvendes i æbler, pærer, blommer og kirsebær til bekæmpelse af frugttræspindemiders vinteræg. Desuden til bekæmpelse af spindemider i prydblplanter i væksthuss.

Virkemåde

Apollo® 50 SC er et specifikt kontaktmiddel, som kun er virksomt overfor nogle få arter af spindemider, herunder frugttræspindemiden (*Panonychus ulmi*).

Apollo® 50 SC virker på frugttræspindemidens æg og anvendes primært på vinteræggene. Der kan dog forventes nogen effekt på spindemidens 1. larvestadie. Midlet har ingen virkning på de to efterfølgende nymfestadier og på voksne mider.

Sprøjeteknik

For opnåelse af det bedst mulige resultat, anbefales det at der anvendes en sprøjeteknik og væskemængde, der sikrer at alle plantedele dækkes af sprøjtevæske, således at såvel levende mider som æg rammes. Specielt vinteræggene sidder godt beskyttet på undersiden af unge grene, i grenvinkler og revner i barken.

Væskemængde i frugtavl

Apollo® 50 SC anvendes normalt i 150-300 ltr. vand pr. ha til fuldt udvoksede frugttræer.

Sprøjetidspunkt

Frugttræer

Apollo® 50 SC kan udsprøjtes fra det tidlige forår og frem til stadie "grøn spids". Vinteræggene klækkes normalt lige før og under blomstringen.

Apollo® 50 SC har ingen eller kun svag påvirkning af rovinsekter og rovmidler og kan med fordel anvendes, hvor der er udsat rovmidler til bekæmpelse af frugttræspindemider.

Behandling med Apollo® 50 SC vil normalt give tilstrækkelig beskyttelse mod frugttræspindemider. Apollo® 50 SC kan anvendes i kombination med rovmidler, således at en eventuel senere opformering i forbindelse med gunstigt (varmt) sommervejr elimineres af rovmidlerne.

Dosering og anvendelseseskema

Kultur	Dosering
Frugttræer	0,4 ltr. Apollo 50 SC pr. ha
Prydblplanter i væksthuss *	0,04% Apollo 50 SC

*) Apollo® 50 SC kan anvendes til bekæmpelse af væksthuss-spindemider (*Tetranychus urticae*) i snit- og potterøser i væksthuss. Der sprøjtes til begyndende afdrypning.

Da tålsomheden overfor andre prydblplanter, af Apollo® 50 SC (i væksthuss), enten ikke er kendt eller kan variere afhængigt af bl.a. sort og varietet, bør der altid foretages en prøvesprøjtning med mindst 14 dages iagttagelsestid for større arealer sprøjtes.

Blandinger

Apollo® 50 SC kan til frugttræer blandes med de i frugtavl normalt anvendte svampemidler.

Anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til bekæmpelse af frugttræspindemidens vinteræg senest på grøn spids med 0,4 liter/ha.



Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld tanken ca. halvt med vand, start omrøringen og tilsæt Apollo® 50 SC under fortsat opfyldning. Ved blanding med et andet produkt skal middel nr. 1 være opløst/fordelt i væsken, før middel nr. 2 tilsættes. Hold omrøringen i gang og sprøjt umiddelbart efter tilberedning.

Øvrige forhold

Det kan ikke udelukkes at visse midestammer kan udvikle resistens mod Apollo® 50 SC. Da forekomsten af resistens ikke kan forudses, kan producent og distributør ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab eller skader på afgrøder som følge af svigtende effekt mod resistente stammer. Såfremt brugeren har mistanke om forekomst af tolerante eller resistente stammer, anbefales alternative behandlinger efter samråd med den lokale konsulent.

For at undgå, at resistens opstår, bør Apollo® 50 SC højst anvendes 1-2 gange pr. vækstsæson. Midler indeholdende hexyiazox (Nissuron) har samme resistensmekanisme som Apollo® 50 SC og kan derfor ikke erstatte en Apollo® 50 SC behandling.

Opbevaring

Skal opbevares frostfrit.

Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllvandet hældes op i sprøjtevæske.

Produktansvar

Informationen om produktets anvendelse er baseret på producentens seneste erfaringer, og er derfor alene at forstå som anbefalinger. Mange faktorer såsom vejrforhold, jordtype, sorter, resistens, sprøjeteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets effekt. Nordisk Alkali påtager sig intet ansvar for følgerne af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af produktet i strid med medfølgende instruktioner, ligesom Nordisk Alkali ikke påtager sig ansvar for indirekte tab herunder avancetab og lignende. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

® = Registreret varemærke for Irivita Plant Protection N.V.
Member of the Makhteshim-Agan Group.

Etikette nr.: I
GODKENDT

31 MRS. 2008

for pakninger på: 1 Ltr
Miljøstyrelsen



Distribution:
Nordisk Alkali
Middelbovej 1
8900 Randers
Tlf. 8642 5692/4649 1171
www.nordiskalkali.dk

1242-FEB08-A

Productname : Apollo 50 SC Label cod : 1242-FEB08-A
Country : Denmark Label dimensions : 270x170 mm
Package size : 1 L Label date : February 2008