

BANJO® FORTE

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartoffer.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse:

dimethomorph 200 g/l (17,0 % w/w) &

fluazinam 200 g/l (17,0 % w/w)

Formulering;

Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)

Svampemiddel nr.: 396-58

Virkemåde: FRAC 40, 29

Indeholder fluazinam. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses-middelforordningen 1107/2009

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Holland

www.adama.com

10 L e

®ADAMA Registrations B.V.

Etiket nr: IV


GODKENDT

16. februar 2021

for pakninger på
Miljøstyrelsen

Frauzska 01-01

5L, 4x5L,
10L & 2x10L



Scan for brug



ANEBJOFDK10L1/01/A

BANJO® FORTE



Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.


Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401) • Mistænkt for at skade det ufødte barn (H361d) • Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410) • Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280) • Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst • Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte • Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3) • Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) • Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405) • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Indånding: Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge og vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet.

Hudkontakt: Fjern straks forurenede tøj, og vask umiddelbart herefter huden med rigeligt vand, efterfulgt af sæbe og vand. Dette er vigtigt for at minimere kontakten med huden. Forurenede tøj bør vaskes, for det anvendes igen.

Øjenkontakt: Skyl straks med øjenskyl eller rent vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg straks lægehjælp.



UN 3082





Swampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.


Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401) • Mistænkt for at skade det ufødte barn (H361d) • Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410) • Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj (P280) • Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst • Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte • Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3) • Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand (SP1) • Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405) • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Indånding: Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge og vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet.

Hudkontakt: Fjern straks forurenede tøj, og vask umiddelbart herefter huden med rigeligt vand, efterfulgt af sæbe og vand. Dette er vigtigt for at minimere kontakten med huden. Forurenede tøj bør vaskes, for det anvendes igen.

Øjenkontakt: Skyl straks med øjenskyl eller rent vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg straks lægehjælp.



UN 3082



DENMARK

Virkemåde

Banjo® Forte indeholder to aktivstoffer fluazinam og dimethomorph. Banjo® Forte er et ikke systemisk middel med kontaktvirkning og skal anvendes forebyggende til bekæmpelse af kartoffelskimmel.

Banjo® Forte indeholder to aktivstoffer fluazinam og dimethomorph. Banjo® Forte er et ikke systemisk middel med kontaktvirkning og skal anvendes forebyggende til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Første sprøjtning udføres inden udsigt skimmelfavorabelt vejr. Visse år kan det være aktuelt at sprøjte fra 100 % fremspiring. Visse år kan det være aktuelt at sprøjte fra 100 % fremspiring.

ANVENDELSE OG DOSERING

Banjo® Forte må anvendes med en dosering på op til 1,0 L/ha maksimalt 4 gange til bekæmpelse af kartoffelskimmel i kartofler som angivet i nedenstående tabel. For at opnå optimal beskyttelse af afgrøden udføres den første sprøjtning inden betingelserne for skimmelangreb er til stede. Efterfølgende sprøjtninger udføres afhængig af risikoen for skimmelangreb dog stadig som forebyggende sprøjtninger med maksimalt 10 dages interval.

Afgrøde	Sygdom	Tidspunkt BBCH	Antal behandlinger, maks	Sprøjtinterval, dage	Dosis pr. Behandling, L/ha
Kartofler	Kartoffelskimmel	31-91	4	5-10*	1,0 (0,75-1,0)**

*:Sprøjtinterval ned til 5 dage anbefales kun ved særligt højt infektionstryk.

** : den lave dosering bør kun anvendes ved lavt infektionstryk.

For at sikre en god og ensartet dækning på blade og stængler bør der bruges 200 L. vand pr/ha.

RESISTENSSTRATEGI

Fluazinam hhv dimetomorph tilhører grupperne di nitroaniliner (FRAC gruppe 29) henholdsvis carboxylsyre amider (FRAC gruppe 40). "For såvidt angår fluazinam vurderes det, at der er lav risiko for udvikling af resistens. Der er dog konstateret typer af kartoffelskimmel i Holland med nedsat følsomhed overfor fluazinam. Der er i Danmark ikke konstateret resistens overfor fluazinam i de seneste år. For så vidt angår dimetomorph vurderes det at der er lav til moderat risiko for udvikling af resistens. Aktivstoffet dimetomorph kan udvikle krydsresistens med de øvrige aktivstoffer i FRAC

gruppe 40. I Danmark er der ikke kendskab til udviklet resistens overfor aktivstofferne i Banjo® Forte.

Gentagne behandlinger med midler med samme virkemekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. For at mindske risikoen for udvikling af resistens bør produktet maksimalt anvendes i 50% af behandlingerne pr. sæson. Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKE

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

SPRØJTETEKNIK

En god og ensartet dækning af kartoffeltoppen er en forudsætning for god effekt. Fyld tanken med vand og tilsæt Banjo® Forte under omrøring. Efter en evt. pause skal der omrøres igen inden udsprøjtning. Da der er risiko for overfølsomhed, skal der anvendes handsker, støvler og over-træksbukser for at undgå kontakt med huden.

Vandmængde L/ha	Tryk, bar	Hastighed, km/t	Dyse
140-240	2-3	6,0	Fladsprede*

*: hvor der er risiko for afdrift til søer og vandløb, bør der anvendes "lowdrift" dyser.

Forslag til valg af fladsprededyser

Vandmængde (L/ha)	Tryk (bar)	Hastighed (km/t)	Dyse
150	2.7	6.0	ISO F 110-02
200	3.0	6.0	ISO F 110-025
240	3.1	6.0	ISO F 110-03

Forslag til valg af fladsprededyser

Vandmængde (L/ha)	Tryk (bar)	Hastighed (km/t)	Dyse
150	2.7	6.0	ISO LD 110-02
200	3.0	6.0	ISO LD 110-025
240	3.1	6.0	ISO LD 110-03

TANKBLANDING

Banjo® Forte kan blandes med insektmidler som Karate 2,5 WG . Ved blanding med manganprodukter, skal Banjo® Forte tilsættes først. Banjo® Forte må ikke blandes med sprødemidler eller olier.

OPTILMALE VIRKNINGSFORHOLD

Afgrøden skal være i god vækst og ikke hæmmet af tørke eller tidligere sprøjtninger. Banjo® Forte er regnfast så snart sprøjtbevæskan er tørret ind på bladene. Det betyder, at regn 2-3 timer efter udsprøjtning ikke vil påvirke resultatet.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Efter endt sprøjtarbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtbevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtbevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllenvandet hældes op i sprøjtbevæskan."

Emballagen må ikke genbruges.

PRODUKTANSVAR

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.

Registrerede varemærker:

Karate® - Syngenta Limited UK

Banjo® - ADAMA Registrations B.V.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S.
(Fluazainam, Dimethomorph)

9

UN 3082



2 x 10 L

© ADAMA Registrations B.V.

ANEBJOFDK10LT/01/C1

BANJO® FORTE

BANJO® FORTE

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse:

dimethomorph 200 g/l (17,0 % w/w) & fluazinam 200 g/l (17,0 % w/w)

Formulering:

Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)

Svampemiddel nr.: 396-58

Virkemåde: FRAC 40, 29

Indeholder fluazinam. Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelses-middelforordningen 1107/2009

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen


Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Holland
www.adama.com

2 x 10 L

®ADAMA Registrations B.V.




Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401) • Mistænkt for at skade det ufødte barn (H361d)
• Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410)
• Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj (P280) • Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst • Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte • Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3) • Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) • Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405) • Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313). Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Indånding: Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft, hold vedkommende varm og i hvile. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge og vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet.

Hudkontakt: Fjern straks forurenede tøj, og vask umiddelbart herefter huden med rigeligt vand, efterfulgt af sæbe og vand. Dette er vigtigt for at minimere kontakten med huden. Forurenede tøj bor vaskes, for det anvendes igen.

Øjenkontakt: Skyl straks med øjenskyller eller rent vand i mindst 15 minutter med adskilte øjenlåg. Søg straks lægehjælp.



UN 3082



ANEBJOFDK5L/T03/C2
97101282X/201710
DK162434MF-R2