

Etikette nr: II
GODKENDT

16. januar 2018

for pakninger på
Miljøstyrelsen

1000L



bariton[®]

SUPER

1000 liter

Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af hvede, byg, rug og triticale i lukkede industrielle anlæg.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Telefon 45 23 50 00
www.cropscience.bayer.dk

Bayer



5 705628 177428

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Undgå udledning til miljøet (P273).

Udslip opsamlles (P391).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af hvede, byg, rug og triticale i lukkede industrielle anlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere. Der har indeholdt produktet (SP¹).

Må ikke tømmes i kloak afløb.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes.

Det bejdsede korn er bejdsset med Bariton Super som indeholder fludioxonil, prothioconazol og tebuconazol.
Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.


Førstehjælp

Indånding: Bring personen i frisk luft.

Hud: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Øjne: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.



Brugsanvisning

Bariton Super er et bejdsmiddel til bejdsning af vinterhvede, rug, triticale, vårhvede samt vår- og vinterbyg. Bariton Super virker effektivt mod flere frøbårne svampesygdomme. I hvede mod frø- og jordbåren stinkbrand og spireskadende svampe, herunder sneskimmel i vinterhvede. I rug og triticale mod spireskadende svampe. I vinter- og vårbyg opnås effekt imod nøgen bygbrand, byggens stribesygge, frøbårent bygbladplet og spireskadende svampe.

Dosering

100 ml Bariton Super pr. 100 kg udsæd.

Tilsætning af vand

For at sikre en tilstrækkelig dækning er det nødvendigt at Bariton Super anvendes ved tilsætning af vand. Dette kan ske ved anvendelse i portionsbejdsere eller kontinuerlig bejdsere med vandtilsætning. Endelig vandmængde skal tilpasses det enkelte bejdsaneanlæg, men som udgangspunkt kan der tilsættes 100-200 ml vand/hkg korn således at den totale væskemængde kommer op på 200 - 300 ml/hkg.

Virkning mod frøbårne sygdomme

Afgrøde	Sygdom	Dosering
Vinterhvede	Frø- og jordbåren hvedestinkbrand (<i>Tilletia tritici</i>) Spireskadende svampe (<i>Microdochium nivale</i> , <i>Fusarium spp</i>)	100 ml/ 100 kg korn
Vårhvede	Frø- og jordbåren hvedestinkbrand (<i>Tilletia tritici</i>) Spireskadende svampe (<i>Fusarium spp</i>)	100 ml/ 100 kg korn
Triticale	Spireskadende svampe (<i>Microdochium nivale</i> , <i>Fusarium spp</i>)	100 ml/ 100 kg korn
Rug	Spireskadende svampe (<i>Microdochium nivale</i> , <i>Fusarium spp</i>)	100 ml/ 100 kg korn
Vinter og vårbyg	Spireskadende svampe (<i>Microdochium nivale</i> , <i>Fusarium spp</i>) Byggens stribesygge (<i>Pyrenophora graminea</i>) Frøbårent bygbladplet (<i>Pyrenophora teres</i>) Nøgen bygbrand (<i>Ustilago nuda</i>)	100 ml/ 100 kg korn

Bejdsaneanlæg

Bejdsning skal foregå i et egnet bejdsaneanlæg, der kan udføre en kvalitetsbejdsning. Anlægget bør være i god stand og kalibreret for at udføre tilfredsstillende bejdsning med Bariton Super. Sugelangen fra pumpen skal placeres direkte i originalemballagen, for at minimere kontakt med midlet.

Bejdsning

Bariton Super er et bejdsmiddel til bejdsning af vinterhvede, rug, triticale, vårhvede samt vår- og vinterbyg. Bariton Super virker effektivt mod flere frøbårne svampesygdomme. I hvede mod frø- og jordbåren stinkbrand og spireskadende svampe, herunder sneskimmel i vinterhvede. I rug og triticale mod spireskadende svampe. I vinter- og vårbyg opnås effekt imod nøgen bygbrand, byggens stribesygge, frøbårent bygbladplet og spireskadende svampe.

Rengøring

Før og efter bejdsningen bør maskiner, pumper m.m. rengøres grundigt. Bariton Super er vandbaseret. Det betyder, at rengøring kan foretages med vand i maskiner, hvor der udelukkende anvendes Bariton Super. Eventuelt vaskevand skal bortskaffes som kemisk affald.

Udsåning

Under dårlige såbetingelser bør sådybden maksimalt være 4 cm. Behandlet udsæd bør udsås samme år det er bejdsset.

Opbevaring

Opbevares frostfrit.

Opbrudt emballage skal lukkes omhyggeligt efter brug.

Rester og tom emballage

Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

1.000 liter palletanke:

Helt tomme, lukkede og udvendigt rene palletanke, afhentes gratis af firmaet Schütz Container WEB i Tyskland. Bestilling af afhentning foretages ved at udfylde den Euro-Ticket, der er placeret i metallommen på palletanken. Fax skemaet sendes til det fortrykte fax nummer.

Resistensdannelse

Fludioxonil hører til FRAC gruppe 12 og risikoen for resistensudvikling anses for at være lav til moderat.

Prothioconazol og tebuconazol hører til FRAC gruppe 3 og risikoen for resistensudvikling anses for at være moderat.

Det kan ikke udelukkes, at svampe (f.eks. fusarium) udvikler resistens overfor Bariton Super.

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme, f.eks. ved at skifte middel med jævne mellemrum.

Bayer A/S fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

® is a registered trademark of the Bayer Group

12.2017

Svampemiddel nr. 18-580

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse

Fludioxonil 37,5 g/l (3,6% w/w)

Prothioconazol 50 g/l (4,7% w/w)

Tebuconazol 10 g/l (1,0% w/w)

Bemærk: Der dannes et nedbrydningsprodukt (prothioconazol-desthio), som er reproduktionstoksisk i kategori 1B: Kan skade det ufødte barn (H360D).

Indeholder benzisothiazolinon (BIT), methylchlorosiothiazolinon og methylisothiazolinon (C(M)IT og MIT). Kan udløse allergisk reaktion (EUH 208).

Netto 1000 liter

Flydende

Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning.

Fabr.nr.: Påtrykt emballagen.

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i 2 år efter produktionsdatoen. Produktionsdato påtrykt emballage.

UN 3082



5 705628 177428

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Telefon 45 23 50 00
www.cropscience.bayer.dk

Bayer