

BIZZ-IODOSULFURON

Ukrudtmiddel

Må kun anvendes om foråret til ukrudtsbekæmpelse i hvede, vårbyg, vinterrug og triticale

DEKLARATION

Ukrudtmiddel nr. 570-13

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Indhold : 5 x 200 gram

Analyse : Iodosulfuron 50 g/kg

Mefenpyr-diethyl 150 g/kg (safener).

Registrerings-
indehaver:

AGRO **BIZZ**

Herluf Trolles Vej 257

5220 Odense SØ

Tlf 7020 4903

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Risiko for alvorlig øjenskade (R41). Meget giftig for organismer der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidseffekter i vandmiljøet (R50/53)

Undgå indånding af aerosoltåger (S23). Brug beskyttelsesbriller/ ansigts-skærm under arbejdet (S39). Vær opmærksom på at Arbejdstilsynet har regler i den eventuelt lovpligtige leverandør-brugsanvisning samt i arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes om foråret til ukrudtsbekæmpelse i hvede, vårbyg, vinterrug og triticale. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i hvede, vårbyg, vinterrug og triticale ikke anvendes senere end 3 måneder før høst. Må i grønne planter til foder ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer mv.) Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Lokalirriterende



Miljøfarlig

BRUGSANVISNING

Anvendelse

Bizz-iodosulfuron er et bredtvirkende ukrudtmiddel til bekæmpelse af en række ukrudtsarter i hvede, rug, triticale og vårbyg

Sprøjtetidspunkt

Vinterhvede, triticale og rug: Der sprøjtes om foråret når væksten er gået i gang og forårs-fremspringen er sket.

Vårbyg og vårhvede: Der sprøjtes så snart ukrudtet er fremspiret, dog tidligst på stadie 12.

Klima

Bizz-iodosulfuron kan bruges om foråret når væksten er i gang og temperaturen har nået 8° C. Produktet er regnfast efter 4-6 timer. Sprøjt ikke ved kraftig dug eller med udsigt til nattefrost.

Maksimaldoseringer

Afgrødestadie Zadoks	Maksimaldosering
Fra Stadie 12	60 g
Stadie 25-29	70 g
Stadie 30	100 g
Stadie 31	150 g
Stadie 32	200 g

Afgørestadie Zadoks	Antal rajgræs/vindaks pr m ²		
	1 – 40 pl	40 – 150 pl	> 150 pl
St 30.	100 g	-	-
St 31.	150 g	150 g	-
St 32.	200 g	200 g	200 g

Doseringer

Der anvendes mellem 35 og 200 g afhængig af ukrudtsart, afgrøde og blandingspartner og sprøjtetidspunkt. Der tilsættes normalt 0,5 l penetreringsolie.

Ukrudtsarter	Vinterhvede, rug, triticale Max. til stadie 32		Vårbyg og vårhvede Inden stadie 30
	Småt ukrudt	Større ukrudt	
Agerkål, Agersennep, Fugleghræs, Hanekro, Hyrdetaske, Pengeurt, Lugtløs kamille	50 g Bizz-iodosulfuron	75 g Bizz-iodosulfuron	50 g Bizz-iodosulfuron
Spildraps		100 g Bizz-iodosulfuron	

Pileurt, bleg/fersken	75 g Bizz-iodosulfuron	125 g Bizz-iodosulfuron	35 g Bizz-iodosulfuron (1) + 0,3 l Oxitril
Burresnerre, Melde, Pileurt snerle/vej	100 g Bizz-iodosulfuron	150 g Bizz-iodosulfuron	
Rød tvetand, Enårig rapgræs, Rajgræs, Vindaks	150 – 200 g Bizz-iodosulfuron	200 g Bizz-iodosulfuron	70 g Bizz-iodosulfuron (2)
+ Ærenpris, Stedmoder	+0,08 l DFF + 0,4 l Oxitril/CM		+0,05 l DFF +0,25 l Oxitril CM

(1) Ved lave doseringer sikres effekten mod burresnerre ved at tilsætte Gratiil.

(2) Doseringen er kun tilstrækkelig til at hæmme græsset.

Resistens

For at forebygge resistens bør Bizz-iodosulfuron ikke bruges hvert år, men veksle med midler med en anden virkningsmekanisme.

Blandinger

Bizz-iodosulfuron kan blandes med de relevante midler på behandlingstidspunktet, dog kan Ally ikke anbefales. Ved blanding med mangansulfat må penetreringsolier ikke anvendes, derimod anvendes et spredkekæbemiddel. Der må højest anvendes 2 kg mangansulfat pr ha sammen med Bizz-iodosulfuron.

Tilberedning af sprøjtevæske

Fyld sprøjten ½ med vand tilsæt det nødvendige antal poser under kraftig omrøring. Produktet skal være helt opløst inden blandingspartnere tilsættes. Udsprøjtningen skal ske straks efter blanding.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjtestyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 300 liter per hektar.

ISO – Alm fladsprededyser ved 3 bar tryk og 6 km/t

Dysetørrelse	Ydelse (l/ minut)	Væskemængde l/ha
02	0,8	160
025	1,0	200
03	1,2	240

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dag renovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skylevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Rengøring af sprøjten

Efter sprøjtning rengøres sprøjten med vand og et ammoniumbaseret rengøringsmiddel. Tøm sprøjten på det allerede sprøjtede areal.

Efterfølgende afgrøde

Året efter kan der dyrkes alle afgrøder uden restriktioner. Ved såning af vinterraps efter en tør sommer bør marken pløjes, ellers er en harvning nok.

Lagring

Lagres frostfrit i uåbnet emballage

Førstehjælp

Indånding Søg frisk luft, ved intensiv indånding samt ved vedvarende ubehag søges læge. Indtagelse Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, ved vedvarende ubehag søg læge. Fremkald ikke opkastning
Kontakt med huden Ved kontakt med huden fjernes forurenet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe
Kontakt med øjnene Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning.