




# Briotril 400 EC

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs.

## UKRUDTSMIDDEL



**Deklaration:** Ukrudtsmiddel, nr 396-9

**Analyse:** Bromoxynil.....240 g/l (20,5%)

loxylinil.....160 g/l (13,7%)

Som octansyre-ester. Indeholder Solventnaphtha (råolie) tung aromatisk.

**Væske:** nettoindhold 5 L

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

### ADVARSEL

**For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.**

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse

R36/38 Irriterer øjnene og huden

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse

R67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs. Må i korn ikke behandles senere end i vækststadiet 31 og i frøgræs ikke senere end 90 dage før høst.**

**Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.**

Godkendelsesindehaver:

Makhteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

www.mabeno.com

**Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.** Rens ikke sprøjteudstyr nær overflå-devand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

**Må ikke tommes i kloakafløb.**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

**Tom emballage må ikke genanvendes.**

### FØRSTEHJÆLP

Indånding : Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

Huden : Fjern forurenet tøj. Skyl derefter huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.

Øjnene : Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i mindst 15 min. Kontakt læge.

Indtagelse : Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.

Medbring brugsanvisningen ved lægekontakt.



UN 1993



DENMARK



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

T1931B/08

## BRIOTRIL 400 EC

### Brugsanvisning:

Briotril 400 EC er et kontaktmiddel som anvendes til bekæmpelse af ukrudt om efteråret samt foråret i vinter- og vårsæd. Endvidere kan Briotril 400 EC anvendes i det tidlige forår i frøgræsmarker og frøgræs udlagt i renbestand, når græsset har 1½ -2 blade. Udlægsmarker med lucerne, sneglebælg, hvid- og rødkløver samt frøroer kan ligeledes behandles med Briotril 400 EC. Behandling af marker med udlæg skal ske umiddelbart efter, tokimbladet udlæg er sået. Briotril 400 EC optages af ukrudtets blade og virker som et kontaktmiddel. Briotril 400 EC er esterformuleret og giver derfor en god bekæmpelse af ukrudtet selv i kølige perioder og i perioder med lav luftfugtighed.

### Anvendelse:

Korn:

Briotril 400 EC anvendes i vårsæd fra kornets st. 13-31. Vintersæd forår, så snart ukrudtet er saftspændt og væksten er begyndt indtil st. 31. Vintersæd efterår behandles fra st. 11 og frem.

Frøgræsmarker:

Der behandles om foråret, så snart væksten er startet og ukrudtet er småt. Ved forekomst af burrenerre, pileurt eller hanekro med max. 4 løvblade tilsættes 0,6 l Tomahawk 180 EC/Starane 180.

Frøgræs udlagt i renbestand om efteråret:

Der behandles med Briotril 400 EC når græsset er i st. 11-12 (1½-2 blade), for at få en bredere effekt og virkning på flere ukrudtsarter kan der i rajgræsser iblandes Express ST.

### Dosering:

Briotril 400 EC anvendes med 0,2-0,6 l/ha. Mindste dosering i tankblanding med andre ukrudtsmidler.

### Rengøring af sprøjteudstyr:

Der skal anvendes spuledyse ved den indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på det behandlede areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjten fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maximale tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Der bør anvendes et amoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.

Ukrudtsproblem	Ukrudt op til 2 løvblade	Ukrudt 3 – 4 blade
Briotril 400 EC 0,6 l/ha	Forglemmigej, mark Gåsefod, hvidmelet Hyrdetaske Pengeurt Pileurt, Sennep, ager Tvetand Kamille, lugtløs Kamille, skive Fuglegræs Kornblomst Limurt, nat Valmue, korn Evighedsblomst, sump Kål, ager Ærenpris, Kløver, hvid Raps Storkenæb Burrenerre Haremad Svinemælk Gåsemad Hanekro Mælde, svine Vortemælk, Brandbæger, alm. Hejrenæb Hundepersille Kiddike	Forglemmigej, mark Gåsefod, hvidmelet Hyrdetaske Pengeurt Pileurt, Sennep, ager Tvetand Kamille Fuglegræs Kornblomst Limurt, nat Valmue, korn Evighedsblomst, sump Kål, ager Ærenpris Kløver, hvid Pileurt, vej Raps

Tabellen er 85 % effektive og derover i en normal udviklet afgrøde.

For at opnå tilstrækkelig effekt mod ukrudtsarter som ikke fremgår af tabellen skal der tankblandes med andre ukrudtsmidler som, Ally®, Nicanor®, Express®, Harmony® Plus, Tomahawk®, Legacy, Activus® WG, Stomp®, Boxer®. Undersøg mulighederne i Planteværn online eller kontakt din rådgiver for yderligere information.

#### Vejrforhold:

Briotril 400 EC kan anvendes fra ukrudtet er i vækst, men effekten opnåes også ved temperature ned til 2°C, blot der er udsigt til stigende temperatur. Ved udsigt til nattefrost bør behandling undlades. Efter en periode med frost, bør der først behandles når planterne er saftspændte. En høj luftfugtighed vil sikre en optimal plantevækst og dermed også en hurtigere effekt. Selv ved en relativ lav luftfugtighed vil effekten dog komme, men der må påregnes lidt længere tid inden virkningen indtræder. Jordfugten har ingen betydning for virkningen af Briotril 400 EC. Briotril 400 EC kræver 1 times tørvej efter behandlingen.

#### Jordtype:

Briotril 400 EC kan anvendes på alle jordtyper.

Briotril EC udsprøjtes på saftspændte ukrudt. Briotril EC udsprøjtes i min. 150 ltr. Vand pr. Ha. Anvend fladsprededyse, f.eks. Hardi ISO F 02-110 med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-Drift dyse. Ved forkomst af store ukrudtsplanter med et karftig vokslag, som f.eks. spildraps, agersennep og haremad, anvendes dyser med mindre dråbestørrelse, eller trykket øges til 4 bar. Dette vil give en bedre dækning og forhindre sprøjtedråberne i at løbe af ukrudtsplanterne. Vær opmærksom på vinddrift, især når der sprøjtes nær vandmiljøer. Anvend LowDrift dyser.

#### Tilberedning:

Fyld beholderen med vand, omrøringen sættes i gang og den afmålte Briotril 400 EC mængde tilsættes. Eventuel blandingspartner tilsættes og der fyldes helt op med vand. Omrøringen forsættes under kørsel og udsprøjtning.

#### Tankblandinger:

Briotril 400 EC kan blandes med Activus® WG, Ally® ST, Boxer®, Cycocel®, Express® ST, Harmony® Plus, Nicanor® 20 SG, Primera® Super, Starane® 180 S, Stomp® SC, Tern®, Tomahawk® 180 EC, Zenit®.

2

3

® Registrerede varemærker:

Activus® - Feinchemie Schwebda GmbH  
 Ally®, Express®, Harmony® - E.I. du Pont de Nemours & Company  
 Boxer® - Syngenta Ltd.  
 Primera® - Bayer Cropscience  
 Starane® - Dow AgroSciences LLC  
 Stomp® SC, Cycocel® - BASF Agro B.V.  
 Tomahawk® 180 EC - Agan Chemical Manufacturers Ltd.  
 Tern®, Zenit® - Syngenta Participations AG

#### Bortskaffelse:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.  
 Tomme og rengjorte beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken

#### Resistensdannelse:

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

#### Produktansvar:

Informationen om produktets anvendelse er baseret på producentens seneste erfaringer, og forstår derfor alene som anbefalinger. Mange faktorer såsom vejrforhold, jordtyper, sorter, resistens, sprøjteteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets effekt. Makhteshim-Agan påtager sig intet ansvar for følgerne af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af produktet og/eller af anvendelse af produktet i strid med medfølgende instruktioner, ligesom Makhteshim-Agan ikke påtager sig ansvaret for indirekte tab herunder avancetab og lignende.  
 Ved tvivlsspørgsmål bedes De rette henvendelse til Deres leverandør.

## BRIOTRIL 400 EC

### Brugsanvisning:

Briotril 400 EC er et kontaktmiddel som anvendes til bekæmpelse af ukrudt om efteråret samt foråret i vinter- og vårsæd. Endvidere kan Briotril 400 EC anvendes i det tidlige forår i frøgræsmarker og frøgræs udlagt i renbestand, når græsset har 1½ -2 blade. Udlægsmarker med lucerne, sneglebælg, hvid- og rødkløver samt frøer kan ligeledes behandles med Briotril 400 EC. Behandling af marker med udlæg skal ske umiddelbart efter, tokimbladet udlæg er sået. Briotril 400 EC optages af ukrudtets blade og virker som et kontaktmiddel. Briotril 400 EC er esterformuleret og giver derfor en god bekæmpelse af ukrudtet selv i kølige perioder og i perioder med lav luftfugtighed.

#### Anvendelse:

Korn:  
 Briotril 400 EC anvendes i vårsæd fra kornets st. 13-31. Vintersæd forår, så snart ukrudtet er saftspændt og væksten er begyndt indtil st. 31. Vintersæd efterår behandles fra st. 11 og frem.

#### Frøgræsmarker:

Der behandles om foråret, så snart væksten er startet og ukrudtet er småt. Ved forekomst af burrenerre, pileurt eller hanekro med max. 4 løvblade tilsættes 0,6 l Tomahawk 180 EC/Starane 180

Frøgræs udlagt i renbestand om efteråret:  
 Der behandles med Briotril 400 EC når græsset er i st. 11-12 (1½ -2 blade), for at få en bredere effekt og virkning på flere ukrudtsarter kan der i rajgræsser iblandes Express.

#### Dosering:

Briotril 400 EC anvendes med 0,2-0,6 l/ha. Mindste dosering i tankblanding med andre ukrudtsmidler.

#### Rengøring af sprøjtestyr:

Der skal anvendes spuledyse ved den indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på det behandlede areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjten fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maximale tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Der bør anvendes et amonumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.

S1931A/08

agan: color:

4

1




MAKHTESHIM  
A G A N  
BENELUX & NORDIC

# Briotril 400 EC

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs.

## UKRUDTSMIDDEL



**Deklaration:** Ukrudtsmiddel, nr 396-9

**Analyse:** Bromoxynil.....240 g/l (20,5%)  
loxylin.....160 g/l (13,7%)

Som octansyre-ester. Indeholder Solventnaphtha (råolie) tung aromatisk.

**Væske:** nettoindhold **4 x 5 L**

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

### ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse

R36/38 Irriterer øjnene og huden

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpålagte

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs. Må i korn ikke behandles senere end i vækststadiet 31 og i frøgræs ikke senere end 90 dage for høst.**

**Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vand-løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.**

Godkendelsesindehaver:

Makhteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

www.mabeno.com

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyrt nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

**Må ikke tommes i kloakløb.**

**Opbevares utilgængeligt for børn.**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.**

**Tom emballage må ikke genanvendes.**

### FØRSTEHJÆLP

Indånding : Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

Huden : Fjern forurenet tøj. Skyl derefter huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.

Øjnene : Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i mindst 15 min. Kontakt læge.

Indtagelse : Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge. Medbring brugsanvisningen ved lægekontakt.

# UN 1993



UN 1993



DENMARK



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

T1931C/08