



BULLDOCK® MAX 25 SC

Insektmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, sennep, olieræddike, raps, friske ærter med og uden bælg (ikke sukkerærter), kartofler, roer, fodermajs, rybs, rosenkål, hovedkål, bladkål, prydblatter, samt i æbler, pærer, kløver og frøgræs

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Meget giftigt med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Farlig ved indånding (H332).

Undgå indånding af spray (P261).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpålagte sikkerhedsdatablad

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i hvede, rug, triticale, sennep, olieræddike, raps, friske ærter med og uden bælg (ikke sukkerærter), kartofler, roer, fodermajs, rybs, rosenkål, hovedkål, bladkål, prydblatter, samt i æbler, pærer, kløver og frøgræs.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i raps, sennep og olieræddike ikke anvendes senere end 53 dage før høst. Må i roer og kartofler ikke anvendes senere end 28 dage før høst. Må i hvede, rug og triticale ikke anvendes senere end 21 dage før høst. Må i majs, æbler og pærer ikke anvendes senere end 14 dage før høst. Må i hovedkål, rosenkål, bladkål samt friske ærter, med og uden bælg, ikke anvendes senere end 7 dage før høst.

Der må først sås eller plantes bladgrøntsager 60 dage efter høst.

Må i markafgrøder ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må i frugtavl ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.), for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Farligt for bier – for at beskytte bier og andre bestøvende insekter må dette produkt ikke anvendes i blomstrende afgrøder i biernes flyvetid fra kl. 03 til kl. 21 (Spe8).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: se først i brugsanvisningen.

Insektmiddel nr. 347-40.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Analyse: Beta-cyfluthrin 25 g/l (2,5%)

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one og 2-methylisothiazol-3(2H)-one. Kan udløse allergisk reaktion" (EUH208).

Type: Midlet er et suspensionskoncentrat, SC.

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdatoen.

Produktionsdato: Se print på dunken.

Batch nr.: Se print på dunken.

Opbevaring:

I uåbnet original emballage, frostfrit og beskyttet mod direkte sollys og andre varmekilder.

Nettoindhold: 5 liter

Etiketted nr: II
GODKENDT

18. marts 2019

for pakninger på
Miljøstyrelsen

 5L &
4x5L

5L

Godkendelsesindehaver:
Nufarm Deutschland GmbH
Im Media Park 4e
50670 Köln
Tyskland
Tel:+492211791790

 **Nufarm**

Grow a better tomorrow

BRUGSANVISNING

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101). I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301+P312)

Indtagelse: Skyl munden med vand. Søg straks læge.

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lates. Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P304+P340+P312).

Hudkontakt: Fjern forurenede tøj og vask eksponeret hud med mild sæbe og vand fulgt af en skylling med varmt vand. Søg lægehjælp, hvis der udvikler sig skadelig virkning eller irritation.

Øjenkontakt: Fortsæt med at skylle øjnene med rent vand i 20-30 minutter idet øjenlåg ofte trækkes tilbage. Søg læge, hvis der opstår irritation.

Note til lægen: Ingen kendt særlig modgift. Behandl symptomatisk. Maveskylling er indiceret for at opnå fuldstændig tømning.

Bifarlig

Behandling af blomstrende raps, sennep og andre korsblomstrede afgrøder må kun foretages uden for biernes flyvetid (fra kl. 21.00 til kl. 03.00).

Produktbeskrivelse

Bulldock Max 25 SC er et meget effektivt insektmiddel, der tilhører gruppen syntetiske pyrethroider.

Midlet virker på insekterne som en kontaktdgift, men fungerer samtidig som en mavegift. Effekten kommer meget hurtigt ("knock-down effekt").

Bulldock Max 25 SC har en god langtidsvirkning og ved at tilpasse doseringen til afgrødens udvikling, kan man styre virkningen af midlet. Bulldock Max 25 SC virker ved lave temperaturer, har god regnfasthed og er skånsom over for afgrøderne. Der er på mange lokaliteter konstateret nedsat eller manglende virkning af pyrethroider mod glimmerbøsser pga. resistens. Her vil virkningen af Bulldock Max 25 SC og andre pyrethroider være utilstrækkelig og der bør anvendes et middel med anden virkemekanisme.

Anvendelsesområde

Afgrøde	Skadevolder	Behandlingsfrist	Afstand til vandmiljø	Dosering l/ha
Raps, sennep, rybs og olieræddike til frø	Kåltrips, glimmerbøsser, skulpesnudebiller, skulpegalmg	53	20	0,3
Hvede, triticale, rug	Bladlus (efterår og forår), trips, hvedegalmg, Fritfluer	21	20	0,3 0,5
Majs (foder)	Bladlus, trips, Fritfluer	14	20	0,3 0,5
Frøgræs, kløver	Bladlus, trips, Fritfluer	53	20	0,3 0,5
Røer	Trips, bedefluer	28	20	0,3
Kartofler	Bladlus, coloradobiller	28	20	0,3
Friske ærter +/- bælg	Trips og bladrandbiller Ærtebladlus og ærteviklere	7	20	0,3 0,5
Hovedkål (hvid-, rød-, spids og savojkål), rosenkål, Bladkål (kina- og grønkål)	Kåltrips, lille og stor kål-sommerflug, kålmøl	7	20	0,3
Æbler, pærer	Frostmåler, knop-bladviklere, æbleviklere	14	50	0,3
Prydplanter i væksthus	Bladlus, trips, måler- og viklerlarver		20	0,05 %, maks. 2000 l vand/ha



Prydplanter udendørs, planteskolekulturer	Bladlus, trips, måler- og viklerlarver		20	0,05 %, maks. 2000 l vand/ha
---	--	--	----	------------------------------

Må kun anvendes 2 gange pr. vækstsæson.

Vandmængder

Der anvendes 200-400 liter vand pr. ha, i kartofler dog 400-600 liter vand pr. ha. Størst vandmængde i tætte afgrøder. I frugttræer anvendes 250-500 liter vand pr. ha eller koncentrationsprøjtning. Prydplanter sprøjtes til afdrypning.

Tilberedning af sprøjtévæske

Fyld tanken halvt med vand og tilsæt derefter den afmålte mængde Bulldock Max 25 SC under omrøring.

Tankblandinger

Bulldock Max 25 SC kan blandes med svampemidler, mangansulfat og solubor. Tankblandinger udspøjttes umiddelbart efter tilberedning.

Opbevaring

Opbevares frostfrit og utilgængelig for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Renngøring af sprøjte

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylling/ vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtévæske i marken. Restsprøjtévæskens fortyndes med mindst 50 gange og udspøjttes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimale tilladte dosering må ikke overskrides på markniveau.
2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tam tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.
3. Fyld tanken med 10-15 % af tankkapaciteten (100-150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l ALL CLEAR® Extra pr. 100 liter vand. Lad omrøringen og tank-spuleudløse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.
4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml ALL CLEAR® EXTRA pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.
5. Sprøjten fyldes igen med 10-15 % af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuleudløse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal.

Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor produktet er blevet udbragt. Et areal der anvendes til vask må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson. Uvasket sprøjtøudstyr eller traktor skal placeres på behandlede areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljø- ministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Skyllevandet hældes op i sprøjtévæskens. Emballagen må ikke genbruges.

Produktsansvar

Informationen om produktets anvendelse er baseret på producentens seneste erfaringer, og er derfor alene at forstå som anbefalinger. Mange faktorer, såsom vejrforhold, jordtype, sort, resistens, sprøjteteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets effekt. Nurfarm fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivls spørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.