



MAKHTESHIM
A G A N
HOLLAND B.V.

Bumper P

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede og byg



SVAMPEMIDDEL

Deklaration: Svampemiddel, nr. 396-2

Analyse: propiconazol 90 g/l (9%) og
prochloraz 400 g/l (40%)

Væske: nettoindhold **5 L**

Omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler:

ADVARSEL

R36 Irriterer øjnene

R51 Giftig for organismer, der lever i vand

R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Arbejdslostsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige værnemidler skal følges ved udførelsen. Yr. leverandørbegrænsningen samt f.eks. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler. Vask huden efter arbejde.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede og byg.
Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst.

Må ikke anvendes til andre skadedydere end de i brugsanvisningen nævnte, og brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke over-
skrides.

Godkendelsesindehaver:

Makhteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

FØRSTEHJÆLP:

Indånding : Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse : Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud : Fjern forurenet tøj. Vask længe og grundigt med vand.

Øjne : Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjer godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge og vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (søer, vandløb m.v.).
Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt
foderstoffer.



AKTIESELSKABET
KORN- OG FODERSTOF KOMPAGNIET
GRØNDALSVEJ 1, 8260 VIBY J

UN 3082



Lokalirriterende

1100/A/1



MAKHTESHIM
A G A N
HOLLAND B. V.

Bumper P

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede og byg



SVAMPEMIDDEL

Deklaration: Svampemiddel, nr. 396-2

Analyse: propiconazol 90 g/l (9%) og
prochloraz 400 g/l (40%)

Væske: nettoindhold **4 x 5 L**

Omfattet af Miljø- og Energinisteriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Godkendelsesindehaver:
Makhteshim - Agan Holland B.V.
Arihemsøweg 87,
NL-3832 GK Leusden, Holland

ADVARSEL

R36 Irriterer øjnene
R51 Giftig for organismer, der lever i vand
R53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige værnemidler skal følges ved udbringningen, jvf. leverandørbrugsanvisningen samt f.eks. Informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede og byg.

Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst.

Må ikke anvendes til andre skadedydere end de i brugsanvisningen nævnte, og brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

FØRSTEHJÆLP:

Indånding : Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse : Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Hud : Fjern forurenset tøj. Vask længe og grundigt med vand.

Øjne : Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjne : Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge og vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (søer, vandløb m.v.).

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.



AKTIESELSKABET
KORN- OG FODERSTOF KOMPAGNIET
GRØNDALSVEJ 1, 8260 VIBY J

UN 3082



Lokalirriterende

1100/C/1

Bumper P

Brugsanvisning

Bumper P er et svampemiddel som indeholder Propiconazol (triazol familien) og Prochloraz (imidazol familien).

Virkemåde

Bumper P er et bredspektrret svampemiddel. Bumper P er bladgen-nemtrængende og systemisk virkende og bliver hurtigt optaget gennem bladene og transporteres derefter til vækststederne via blad-pladerne og sætstrømmen. Den optagne mængde aftrænger af vækstbetingelser og lokale forhold.

Anvendelse

Bumper P anvendes til bekæmpelse af en række svampesygdomme i hvede og byg.

Afgrøde	Skadegører
Hvede	Hvederunplet Hvedegråplet Meldug Gulrust
Byg	Skoldplet Bygbladplet Meldug Bygrust

Sprøjtetidspunkt

Sprøjtningen må ikke foretages senere end stadie 32-37 (når det tredje knæ er synligt) for hvede og for vinterbyg. Ikke senere end stadie 41-47 (når sidste blads skedehinde er synlig).

Bekæmpelse af bladangreb skal foretages, når afgrøden er i stadie 41 eller senere, når angreb begynder at vise sig. Der kan sprøjtes indtil stadie 59. Ved de senere behandlinger anvendes 1,0 l/ha. Ved meldugangreb på sprøjtetidspunktet skal der anvendes en tank-blending med et svampemiddel som indeholder morpholin.

Tankblandinger med meldugmidler kan give svindinger på afgrøden, disse vil normalt forsvinde med væksten og giver ingen effekt på afgrødeudbyttet.

Virkningsbetingelser

Ved sprøjtning på tørre planter og brug af korrekt sprøjteteknik vil hovedparten af midlet være optaget inden for et par timer, på dugvåde planter er optagelsestiden lidt længere. Vær opmærksom på at regn mindre end 3 timer efter udsprøjtning kan reducere effekten.

Dosering

Hvede og byg: 1,0 - 1,25 l/ha
Vandmængde 200 l/ha

Fremstilling af sprøjtlevæske

Ryst dunken før brug. Fyld sprøjtetanken halvt med vand, tilsæt den beregnede mængde Bumper P og begynd omrøring. Tilsæt den resterende mængde vand under omrøring. Fortsæt omrøring indtil udsprøjtningen er udført.

Rensning af sprøjtedyr

Skyll straks sprøjtten grundigt efter brug. Første hold skyllevand bør udsprøjtes eventuelt på den behandlede afgrøde. Rengør derefter sprøjtedyret med sprøjterens og spul efter med vand.

Bortskaffelse

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affalds-ordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet skyllet grundigt med vand. Skyllevandet hældes op i sprøjtlevæskan.