

Etikette nr: II
GØDKENDT

22. januar 2014
for pakninger på 500ml
Miljøstyrelsen



**Bayer
Garden**



Bladlus



Ullus

- Udendørs og indendørs
- Beskytter i 4 uger
- Virker hurtigt og systemisk

Insektmiddel

Må kun bruges til privat anvendelse til bekæmpelse af insekter på prydplanter udendørs og indendørs.

Calypso® mod insekter

På pryd-
planter



500 ml
koncentrat

0301241806

Calypso mod insekter

Insektmiddel

Må kun bruges til privat anvendelse til bekæmpelse af insekter på pryddplanter udendørs og indendørs.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. (R 50/53)

Ved udsprøjtning af midlet skal der bruges lange bukser og en langærmet trøje.

Vask huden efter arbejdet. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun bruges til privat anvendelse til bekæmpelse af insekter på pryddplanter udendørs og indendørs. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. (Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje). Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



Fordelene ved Calypso:

- Insektmiddel, der yder langtidsvirkende beskyttelse mod insekter, som bladlus, uldlus, cikader, larver af snudebiller m.v. Moderat effekt mod spindemider.
- Virker i op til 4 uger på pryddplanter, roser, buske, hække og træer.
- Kan bruges udendørs og indendørs.
- Aktivstoffet optages i planten og transporteres opad og udad således at skjulte insekter bekæmpes.

Hvornår:

Når insekterne er et problem. Bedst effekt opnås ved tidlig behandling ved begyndende angreb.

Analyse: Thiacloprid.....0,9% w/w (9 g/liter).

Indhold: 500 ml

Opbevaring: Frostfrit.

Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i mindst 2 år efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.

Batch Nr.: Dato påtrykt emballagen.

Ukrudsmiddel nr. 18-481.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S.

Tlf: 45 23 50 00. www.bayergarden.dk



Bayer CropScience



Brugsanvisning:



DNB11 00558

Brugsanvisning:

Kan anvendes til både udvanding i pottedplanter og udendørs sprøjtning.

Ved udsprøjtning på selve planten:

Sprøjt i en afstand af 30-40 cm fra planten med lette fejende bevægelser til blade og stængler er let fugtige. Til sprøjtning anvendes en hånd- eller rygsprøjte. Gentag behandling efter 10 – 14 dage ved kraftige angreb. Mod mellus, uldlus og skjoldlus behandles to gange med 7-14 dages mellemrum for bedste effekt.

Ved udvanding med vandkande i jorden i pletter:

Fordel væsken så at hele rodklumpen bliver vædet.

Væsken gives i små intervaller for at modvirke overløb/afløb.

Metode	Skadevolder	Opblanding i vand	Udbringning af den opblandede væske
Udvanding	Bladlus, mellus, uldlus, skjoldlus, bladbiller, sommerfuglelarver, larver af øresnudebiller og sørgemyg	50 ml Calypso pr. liter vand	100 ml opblandet væske pr. liter pottedjord
Sprøjtning	Bladlus	15 ml Calypso pr. liter vand	Sprøjtning til blade er let fugtige
	Mellus, uldlus, skjoldlus, bladbiller, sommerfuglelarver, bladlus og cikader	20 ml Calypso pr. liter vand	Sprøjtning til blade er let fugtige

Bemærk!

- Aktivstoffet thiacloprid tilhører sammen med imidacloprid og acetamiprid gruppen neonicotinoider. For at modvirke resistensudvikling frarådes gentagne behandlinger, år efter år, udelukkende med midler der indeholder neonicotinoider som aktivstof.
- Behandlingen er regnfast, når sprøjtevæsken er tørret ind på planten.
- Sprøjt kun i stille vejr – Undgå afdrift til andre afgrøder og pryddplanter.
- Efter sprøjtning foretages normal, grundig rengøring af sprøjteudstyret/vandkande. Vaskevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet.

DOSERING



Sørg for at hættten er skruet fast på flasken. Vip forsigtigt flasken, så væsken løber ind i det runde doseringskammer.



For at reducere mængden af væsken i doseringskammeret, vippes flasken forsigtigt tilbage, så den overskydende væske hældes tilbage i flasken.



Stil flasken lodret, tryk ned og drej på hættten for at åbne flasken.



Hæld den opmålte væske ned i sprøjtetanken som vist (tryk ikke på flasken, mens der hældes). Skru hættten på flasken igen.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.