


[\[luk vindue\]](#)

Capture®

Suveræn, når ukrudtet skal bekæmpes i udlægsmarkerne. Viser også lovende resultater på enårig rapgræs.

Brugsanvisning

Afgrøder

Capture kan anvendes om foråret i alle kendte sorter af vårsæd.

Anvendelsesområde og virkningsspektrum

Capture er et skånsomt, bredspektret ukrudtsmiddel, som er effektivt over for både almindeligt og vanskeligt, bredbladet ukrudt. Herudover opnås ved de højeste doseringer en hæmning af enårig rapgræs.

Virkemåde

Ioxynil og bromoxynil optages af ukrudtets blade og virker som kontaktmidler. Diflufenican optages af ukrudtets blade og virker ligeledes som kontaktmiddel. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra det optages af rødderne samt ved fremspiring af nyt ukrudt. Herved opnås en effekt på endnu ikke fremspiret ukrudt. Synlig effekt kan observeres efter 2-5 dage som afblegning og afsvidning af ukrudtet, samt ved hvidfarvning af ukrudtet. Nyfremspiret ukrudt kan fremspire normalt for så senere at hvidfarves og herefter gå ud.

Sprøjteteknik

Capture udsprøjtes i min. 150 ltr vand pr. ha. Anvend fladsprededyser, f.eks. Hardi 4110-14 med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-Drift dyse. Udsprøjtes Capture alene eller i blanding med et minimiddel tilsættes altid sprede/klæbemiddel. Ved forekomst af store ukrudtsplanter med et kraftigt vokslag, som f.eks. spildraps og agersennep, anvendes dyser med mindre dråbestørrelse, eller trykket øges til 4 bar. Dette vil give en bedre dækning og vil forhindre sprøjtetråberne i at løbe af ukrudtsplanterne. Vær opmærksom på vinddrift, især når der sprøjtes nær vandmiljøer - anvend eventuelt Low-Drift dyser.

Sprøjtetidspunkt

Fra kornets 1 bladstadiet til stadium 31.

Dosering

Capture udsprøjtes med 0,3-0,65 ltr/ha, afhængigt af ukrudtets udviklingsstadiet og ukrudtssammen-sætningen. Under optimale sprøjteforhold og -teknik kan behovet tilpasses efter følgende, vejledende oversigt:

Behovsbestemt dosering

Ukrudtsproblem	Ukrudtets udvikling (løvblade)	
	Op til 2 løvblade	3-4 løvblade, samt med udlæg af græsfrø.
Stedmoder Forglemmevej Hyrdetaske Tvetand Ærenpris Bleg pileurt Fersken pileurt	0,3 ltr/ha	0,5 ltr/ha
Agersennep Fuglegræs Hvidm. gåsefod Kamille Limurt Pengeurt Raps Snerle pileurt Valmue	0,5 ltr/ha	0,65 ltr/ha
Enårig rapgræs	0, 65 ltr/ha	
Burresnerre Vej pileurt		-

Blandinger

Blanding med andre ukrudtsmidler er normalt ikke nødvendig. Ved store forekomster af hanekro kan Capture udsprøjtes i blanding med et sulfonylureamid (f.eks. Express, Harmony Plus el. Logran, husk at tilsætte spredemiddel). Ved store forekomster af burresnerre kan Capture udsprøjtes i blanding med Starane 180. Capture kan blandes med Amistar, Tilt MegaTurbo, Tilt Top, Sportak, Rival og Corbel. Desuden med chelaterede mikronæringsstoffer eller max. 2,0 kg mangansulfat pr. 100 ltr vand. Husk altid at læse etiketten på blandingspartneren. Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger.

Anerkendelser

Capture er anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til bekæmpelse af fuglegræs, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, lugtløs kamille, limurt, snerle pileurt, raps, sennep, stedmoder, tvetand og storkronet ærenpris i vårbyg med 0,65 ltr/ha, når ukrudtet har 2-3 blade.

Klimaets betydning

Den bedste effekt opnås ved at udsprøjte Capture ved høj luftfugtighed og i lunt vejr, samt ved morgensprøjtning. Capture kan anvendes, når temperaturen er over 6°C, den bedste effekt opnås imidlertid, når temperaturen er over 10°C. Regn mere end 6 timer efter udsprøjtning af Capture er normalt uden betydning for effekten.

Jordtype - jordfugt

Jordtypen har ingen betydning for effekten af ioxynil og bromoxynil, men på humusjorde kan der være nedsat effekt af diflufenican. God jordfugt på sprøjtetidspunktet og i perioden umiddelbart herefter, vil øge effekten og langtidseffekten af Capture.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt Capture og fyld op med den resterende vandmængde. Tilsæt eventuel tankblandingspartner. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen. Alle bekæmpelsesmidler bør behandles med forsigtighed, og egnet beskyttelsesudstyr bør anvendes.

Produktmæssige begrænsninger

Capture er farlig for bier. Capture må ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøer (søer, vandløb m.v.).

Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Dog kan den tomme emballage bortskaffes til anden kommunal affaldsordning, hvis emballagen er blevet grundigt skyllet med vand (min. 4 gange). Skyllvandet hældes op i sprøjtevæsken.

Analyse

Ioxynil 200 g/ltr (14,9%)
Bromoxynil 300 g/ltr (22,4%)
Diflufenican 50 g/ltr (3,7%) som salte.
Flydende.

Emballagestørrelse

5 liter

Opbevaring

Skal opbevares frostfrit

Fareklasse

Sundhedsskadelig og farlig for bier.

Advarselstekst

Ukrudtsmiddel nr. 132-89

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Mulighed for skade på barnet under graviditeten. R63.

Farlig ved indtagelse. R22.

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R51/53.

Arbejdstilsynets regler om arbejdets udførelse og brug af personlige værnemidler skal følges ved anvendelsen, jf. leverandørbrugsanvisningen samt fx. informationsmateriale fra Arbejdstilsynet om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vårsæd med udlæg xxxxxxxx.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i vårsæd ikke anvendes senere end kornets stadie 31.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøer (søer, vandløb m.v.)

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

Emballage må ikke genanvendes (se brugsanvisningen).

Førstehjælp**Indånding**

Sørg for frisk luft. Sørg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og giv rigelige mængder vand at drikke. Sørg læge, medbring denne brugsanvisning.

Hudkontakt

Fjern forurenede tøj. Vask huden med rigelige mængder vand og sæbe. Sørg læge ved fortsat ubehag. Medbring denne brugsanvisning.

Øjenkontakt

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelt kontaktlinser. Sørg læge ved fortsat ubehag.

Medbring denne brugsanvisning.

 [Top](#)

[\[luk vindue\]](#)