

Etikette nr.: III
GODKENDT

26 JAN. 2010

for pakninger på 1 L.
Miljøstyrelsen

Ukrudtsmiddel nr.: 361-2

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.

Analyse: Clopyralid 100 g/l (9,5%).

Indhold: 1 liter



CLIOPHAR

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning.

FORSIGTIG

Vær opmærksom på, at arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer, rødbeder, vinterraps, kålfrø og rosenkål hvert 4. år og i skovkulturer ved pletsprøjtning.

I bederoer, rødbeder og rosenkål må maksimalt anvendes 0,25 l/ha og kun som bånd- eller pletsprøjtning som anført i brugsanvisningen.

Brugsanvisningens doseringsangivelse må ikke overskrides.

Må i rosenkål, rødbeder og bederoer ikke anvendes senere end 2½ måned før høst, i raps ikke senere end 3 måneder før høst.

Opbevares utilgængeligt for børn (S2).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).

Distributør:



DLA Agro

Centerhavnsvej 13 7000
Fredericia tlf. 79 21 21 21

Godkendelsesindehaver:



AGRI PHAR S.A.

rue de Renory, 26/1
4102 Ougrée
BELGIEN

26 JAN. 2010

for pakninger på 7 L
Miljøstyrelsen

Sprøjeteknik:

Brug 200-300 liter vand pr. ha.
Brug LD dyser (Low Drift dyser) hvis der er fare for adrift.
Andre kombinationer kan anvendes, se sprøjtemanual og diverse tabeller om emnet.

Forslag til dyser, tryk og kørehastighed:

Dyse	Tryk	Hastighed	Vandmængde
ISO F/LD 025	3 bar	6,0 km/t	200 l/ha
ISO F/LD 03	3 bar	6,0 km/t	240 l/ha
ISO F/LD 04	3 bar	6,0 km/t	320 l/ha

Tilberedning af sprøjtevæsken: Fyld sprøjtes tank halvt op med vand, start sprøjtes omrører, tilsæt den beregnede mængde CLIOPHAR, fyld tanken med vand, evt. olie tilsættes lige før tanken er fyldt. Lad omrøreren køre mens der sprøjtes.

Blanding med andre midler: CLIOPHAR kan blandes med de almindelige brugte ukrudts- svampe- insektmidler og mikronæringsstoffer samt olie. CLIOPHAR må ikke blandes med produkter med Triflusaluron (Safari®), og der skal gå mindst 14 dage efter en behandling med Triflusaluron før CLIOPHAR bruges mod tidsler. Det er vigtigt at der igen er god vækst i tidslerne inden der sprøjtes.

Rengøring af sprøjtet: Det er vigtigt at få rengjort sprøjtet da selv mindre rester af CLIOPHAR kan skade følsomme afgrøder. Rens tanken med et egnet rensmiddel. Undgå at skyllevand og renssevæske kommer ud i vandmiljøet vær opmærksom på drænen. Det er bedst at tømme skyllevand og renssevæske ud på det areal der lige er sprøjtet.

Omsåning og efterfølgende afgrøder: Følgende afgrøder er følsomme over for CLIOPHAR: Bælgplanter, ærter, bønner og lupiner. Natskyggefamilien, kartofler og tomater. Skærmpplanter, gulerødder. Salater og andre kurveblomsstredede. Planterester fra en afgrøde der er sprøjtet med CLIOPHAR må ikke bruges til kompost eller i drivhuse. I en mark hvor der er brugt CLIOPHAR kan der i efteråret kun sås vintær eller vinterraps. Næste forår kan der sås korn, græs, majs, bederoer og vårraps. Er der foretaget en finceling af behandlede planterester og efterårspløjet kan der sås følsomme afgrøder det følgende forår.

Rester og tom emballage: Skyllet emballage kan bortskaffes med dagrenovationen.

Rester afleveres: På den kommunale modtagerstation.

Opbevaring: Opbevares frostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Transport: Der er ingen krav eller klassificering i henhold til ADR og IMDG.

FØRSTERHJÆLP:

Indånding: Bring patienten ud i frisk luft.
Indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Drik meget vand eller mælk. Opkastning må ikke fremprovokeres. Konsulter altid læge.
Hudkontakt: Vask straks med store mængder vand. Fjern gennemvædet tøj.
Øjenkontakt: Skyl straks med vand i flere minutter, bedst med en øjenskylle flask.
Generelt: En bevidstløs person skal straks på hospital/skadedstue. Ved fortsat ubehag konsulteres læge/hospital. Tag etiketten eller sikkerhedsdatablad med til lægen. Lægen der behandler kan indhente mere information ved Giftvagtten på Bispebjerg Hospital tlf. 35 31 60 60.

BRUGSANVISNING

Anvendelse: CLIOPHAR er et systemisk virkende ukrudtsmiddel, der primært optages gennem ukrudtets blade. Ukrudtsplanterne vil stoppe væksten og visne bort i løbet af 2-3 uger. CLIOPHAR anvendes til bekæmpelse af kamille, svinemælk, tidsel, gul okseøjle, haremad, grå bynke, brandbæger og andre kurveblomsstredede planter, samt snerlepleurt og ærter. CLIOPHAR optages bedst, når der sprøjtes på saftspændte planter i god vækst, og på småt ukrudt. Dagtemperaturen skal være over 12°C og nattemperaturen over 5°C. Undgå at sprøjtet i skarp sol og ved meget høje temperaturer. Der skal være mindst 6 timers tørvejrr efter udsprøjtningen.

Dosering og behandlingstidspunkt:

Afgrøde	Dosering	Tidspunkt	Bemærkninger
Vinterraps	0,8 l/ha	Forår når væksten er begyndt	Mod kamille og andet kurveblomsstret ukrudt. Må maksimalt anvendes hvert 4. år på samme areal.
Bederoer og rødbeeder, kalfør og rosenkål	0,25 l/ha	Ukrudtets 2-4 bladstadi	1,0 l/ha i 12,5 cm bånd 50 cm rækkeafstand. Kan anvendes i blanding med andre ukrudtsmidler for at forstærke effekten på kamille og snerle pleurt. Må maksimalt anvendes hvert 4. år på samme areal
Bederoer og rødbeeder, kalfør og rosenkål	1,0 l/ha	Trødsel, bekæmpelse når de er 15-20 cm. høje	Plet behandling. Tidsel-pletterne må maksimalt udgøre 25% af hver hektar. Må maksimalt anvendes hvert 4. år på samme areal
Etablerede trækulturner, gran- og ædelgranarter	1,5 l/ha	10-30 cm højt ukrudt	Plet behandling til bekæmpelse af tidsler, grå bynke, brandbæger, bakkestjerne mfl.