



CLOFLUFIX

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i frøgræs og græsmarker en gang om foråret

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr: 650-121

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof:

Clopyralid 20 g/l (1,82% w/w)

Fluroxypyr 40 g/l (3,63% w/w)

MCPA 200 200 g/l (18,22% w/w)

Formulering: Midlet er et suspensionskoncentrat

Batchnummer: Se emballagen

Produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen.

Emballage:
5 liter

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Irriterer øjnene (R36). Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Meget giftigt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/53).

Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden.

Brug egnede beskyttelseshandsker. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i frøgræs og græsmarker. Må kun anvendes én gang om året og ikke senere end 1. august. Behandlede arealer må ikke afgræsses før 30 dage efter behandling. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand. Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje. Må ikke tømmes i kloakløb. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse: Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Hudkontakt: Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Registreringsindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding tlf. 3013 2327 • E-mail: to@agros.dk



Miljøfarlig



Lokalirriterende

Brugsanvisning Cloflufix

Generelt

Cloflufix er et systemisk og kontaktvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af 2-kimbladet ukrudt i frøgræs og på græsmark. Bekæmper bla hvidmelet gåsefod, burresnerre, fersken-, vej-, og snerepileurt, korsblomstret ukrudt, burresnerre, kamille, hyrdebusk, fuglegræs, hanekro, krumhals, lidennælde, lægejordrøg, natlimum, svinemælde, valmue, pengeurt, haremåd og tidsler. Den bedste effekt opnås når temperaturen er over 10°C. Sprøjt eventuelt kun på steder med bredbladet ukrudt. **PAS PÅ!** blomster, prydblåter og grøntsager kan skades af produktet, vær derfor opmærksom på vinddrift.

På folsomme ukrudtsarter vil der normalt ses effekt 1-2 dage efter behandling. Væksten standses og ukrudtsplanterne visner bort i løbet af 2-3 uger. Bedste resultat opnås i tørvejr uden udsigt til regn. Full effekt vil være opnået 2-3 uger efter behandlingen.

Cloflufix ikke må anvendes, hvor der er kløver, lucerne eller andre bælgplanter i udlægget.

Efterfølgende afgrøde:

Følgende afgrøder er folsomme over for Cloflufix: Kartofler og andre arter af natskyggefamilien. Ært, bønne, lupin og andre bælgarter. Gulerod og andre skræmblomstrede. Salat og andre kurv-blomstrede.

Vækstmaterialer fra en afgrøde der er behandlet med Cloflufix, og som ikke er nedbrudt, kan skade en efterfølgende folsom afgrøde. Derfor bør der ikke etableres folsomme afgrøder for den behandlede afgrøde er nedmuldet. Halm fra behandlede afgrøder må ikke anvendes i drivhuse eller som kompost.

Brugsanvisning

Cloflufix	Skadegørere	Dosis pr. ha.		Bemærkninger
		1 års mark	2 til flerårs mark	
Frøgræs, Græs	Agersnerp, hvidmelet gåsefod, hyrdebusk, spildraps, markforglemmeje, storkensneb	2,5 l	3,0 l	Forår når ukrudtet er i vækst, maks 1 behandling pr. sæson
Frøgræs, Græs	Alm. pengeurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, liden nælde, lugtles kamille, natlimum, snerepileurt, vaspelurt, sort natskygge, valmue, blegpileurt, brandbæger, ærenpris, dværgløvfod. Læge jordrøg, tvetand, ærenpris(andre), agerstedmoder og spergel	2,5 l	3,5 l	Forår når ukrudtet er i vækst, maks 1 behandling pr. sæson

Virkemåde og resistensklasse:

Cloflufix er et systemisk virkende produkt, det indeholder Clopyralid 20 g/l, Fluroxypyr 40 g/l samt MCPA 200 g/l. Det optages gennem bladene og transporteres herfra med safstrømmen til rødder og underjordiske udløbere. Cloflufix tilhører resistensklasse HRAC gruppe 0, og risikoen for resistensdannelse er derfor lille.

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjtedyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 100 til 200 liter per hektar

Sprøjteteknik			
Dyse	Bar	Km/time	l/ha
ISO-020- Gul	2,5	6,5	150
ISO-025- Lilla	2,5	6,5	185
ISO-030- Blå	2,5	5,7	250

Renngøring af sprøjtedyret

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldedyret: Restsprøjtetvæskens og skyllevand udskrøjes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldedyret. Skyllevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtetvæskens kan fortyndes mindst 50 gange. Ved hjælp af de indvendige spuledyre vaskes sprøjtetanken straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så indvendig vask og udspøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

Skyllevand udskrøjes på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udskrøjes under kørsel på det behandlede areal

Udvendig:

Renngøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamlings til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31. marts 2009. Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovligtvis sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Bemærk.

Agros fralægger sig erhvervet ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Vejrtil, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten

Bortskaffelse af tom emballage.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtetvæskens. Emballagen må ikke genbruges.