

# CLOPYRALID 100

## UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, ryps, bederoer, rødbeder, kålafgrøder, kålfrø, majs, korn, kommen og jordbær samt på arealer uden spise- eller foderafgrøder.

### FORSIGTIG

Indhold  
1.0 liter

Arbejdsministeriets regler om arbejdstøj og personlige værnemidler skal overholdes ved udsprøjtningen, jf. f.eks. informationsmateriale fra Arbejdsministeriet om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i raps, ryps, bederoer, rødbeder, kålafgrøder, kålfrø, majs, korn, kommen og jordbær samt på arealer uden spise- eller foderafgrøder.

Raps, ryps, bederoer, rødbeder, kålafgrøder og majs må ikke behandles senere end 2 1/2 måned før høst.

Korn må ikke behandles senere end 6 uger før høst.

Kommen og jordbær må kun behandles om efteråret.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt fodestoffer.

Tom emballage skal uskadeliggøres som anført i brugsanvisningen.

### FØRSTEHJÆLP:

**Indånding:** Bring vedkommende i frisk luft. Søg læge ved fortsat ubehag.

**Hud:** Forurenede tøj fjernes, og huden vaskes med vand og sæbe.

**Øjne:** Skyl omgående med vand i 15 min. Søg læge ved fortsat ubehag.

**Indtagelse:** Fremkald ikke opkastning. Giv rigeligt med vand eller mælk. Søg lægehjælp

## DEKLARATION:

Ukrudtsmiddel nr. 21-98

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

**Analyse:** Clopyralid.....100 g/l (9,56%)

Væske. Nettoindhold 1,0 liter

Godkendelsesindehaver: KemiAgro AmbA, Viborgvej 128, 8210 Århus V.

Fabr. nr.: A1.08.95

## BRUGSANVISNING

### Virkning

Clopyralid 100 er et ukrudtsmiddel med systemisk virkning. Det anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i raps, ryps, bederoer, rødbeder, kålafgrøder, majs, kommen og jordbær samt på arealer uden spise- eller foderafgrøder.

Kommen og jordbær må kun behandles om efteråret.

Clopyralid 100 optages gennem bladene, og efter optagelse standser ukrudtsplanternes vækst. I løbet af 2-3 uger visner de bort.

### Anvendelse

Clopyralid 100 anvendes til bekæmpelse af kamille, tidsel, svinemælk, grå bynke, gul okseøje, brandbæger og andre kurvblomstrede ukrudtsarter samt snerlepileurt og ærter.

Da Clopyralid 100 har systemisk virkning, opnår man bedst effekt, når der sprøjtes på saftspændte planter i aktiv vækst. Bedste behandlingstidspunkt er tidligt på dagen, ved høj luftfugtighed og temperatur på behandlingstidspunktet over 10-12 gr. C.

Bedst effekt opnås ved sprøjtning på småt ukrudt. Det er vigtigt, at der sprøjtes inden ukrudtet går i knop, da den aktive vækst standser på det tidspunkt. Tidsløse bekæmpes bedst, når de er 15-20 cm høje.

Det frarådes at sprøjte ved udsigt til nattefrost og ved meget høje temperaturer. Regn indenfor 6 timer efter sprøjtning kan forringe virkningen.

Vandmængde: 200-300 liter pr. ha. og fladsprededyser.

### Dosering

**Bederoer og rødbeder:** 1,0-1,5 liter pr. ha. når ukrudtet begynder at skyde fra rosetstadiet. Tidsløse bør være 15-20 cm høje.

Eller 0,5-1,0 liter pr. ha. sammen med 2. eller 3. ukrudtsprøjtning i roerne mod kamille og snerlepileurt.

**Vårrops og ryps:** 1,0 liter pr. ha. når afgrøden har 2-6 blivende blade. Mod gul okseøje skal anvendes 1,2-1,5 liter pr. ha.

**Vinterraps og kålfrø:** 1,0 liter pr. ha. i september-oktober når afgrøden har 4-6 blade. Eller 1,2-1,5 liter pr. ha. om foråret så snart væksten er begyndt.

**Korn:** 0,7-1,0 liter pr. ha. når afgrøden har 2-6 blade. Kan udsprøjtes i tankblanding med andre ukrudtsmidler. Clopyralid 100 kan anvendes indtil kornet skrider.

**Majs og kålafgrøder:** 1,2-1,5 liter pr. ha. når ukrudtet begynder at skyde fra rosetstadiet. Tidsløse dog 15-20 cm.

**Kommen:** 1,2-1,5 liter pr. ha. i november-december når afgrøden er helt standset i vækst.

**Jordbær:** 1,2-1,5 liter pr. ha. i august-oktober (jordbær må kun behandles om efteråret). Nogle af de nye sorter kan være følsomme.

**Gran- og ædelgranarter (etablerede kulturer):** 1,5-2,0 liter pr. ha. når ukrudtet er 10-30 cm højt og inden det går i knop.

### Tilberedning af sprøjtevæsken

Fyld tanken halvt med vand og tilsæt under omrøring den afmålte mængde Clopyralid 100. Derefter tilsættes den resterende mængde vand. Ved tankblanding med midler som er pulver eller granulat, skal disse opløses i tanken inden Clopyralid tilsættes.

Omrøring forsættes under transport og udsprøjtning. Tankblandinger skal udsprøjtes straks.

### Blandinger

Clopyralid 100 kan tankblandes med de almindeligt anvendte ukrudts- svampe- og insektmidler samt mikronæringsstoffer og olier.

### Bemærk

Følgende afgrøder er følsomme overfor behandling med Clopyralid 100:

Kartofler og andre natskyggearter.

Ærter, bønner, lupin og andre bælgplanter.

Gulerod og andre skærmplanter.

Salat og andre kurvblomstrede.

Plantemateriale fra en afgrøde behandlet som angivet på etiketten, og som er blevet findelt, spredt og nedpløjet om efteråret, vil ikke skade en forårsået følsom afgrøde.

Plantemateriale med rester af Clopyralid kan skade en efterfølgende følsom afgrøde. Undgå derfor en følsom afgrøde som f.eks. læggekartofler umiddelbart efter, at plantemateriale fra en afgrøde behandlet med Clopyralid 100 er nedpløjet.

Plantemateriale fra en afgrøde behandlet med Clopyralid 100 bør ikke anvendes i drivhus eller til kompost.

Efter sprøjtning med Clopyralid 100 skal sprøjteudstyret gøres grundigt rent før det anvendes i en følsom afgrøde.

Vær opmærksom på risiko for vinddrift.

Vær især omhyggelig ved anvendelse af Clopyralid 100 forud for læggekartofler, da Clopyralid kan koncentreres i knoldene og forårsage unormal vækst. Pas på vinddrift ind over en mark med læggekartofler.

### Opbevaring: Frostfrit.

### Bortskaffelse af tom emballage

Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning.

## DISTRIBUTION:

KemiAgro AmbA

Viborgvej 128 · 8210 Århus V

Telf. 86 75 24 55