



VÆKSTREGULERINGSMIDDEL

MÅ KUN ANVENDES TIL VÆKSTREGULERING I PRYDPLANTER I LUKKEDE VÆKSTHUSE. DETTE PLANTEBESKYTTELSESMIDDEL MÅ KUN KØBES AF PROFESSIONELLE OG ANVENDES ERHVERVSMÆSSIGT OG KRÆVER GYLDIG AUTORISATION.

VÆKSTREGULERINGSMIDDEL NR. 544-3

OMFATTET AF MILJØMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE OM BEKÆMPELSMIDLER OG PLANTEBESKYTTELSESMIDDEFORORDNINGEN 1107/2009

AKTIVT STOF: 6-BENZYLADENIN 20 g/l (1.95% W/W)
MIDLET ER ET SUSPENSIONS KONCENTRAT

INDEHOLDER 1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ON (BIT) OG 2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ON (MIT). KAN UDLØSE ALLERGISK REAKTION (EUH 208)

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til vækstregulering i prydplanter i lukkede væksthuse. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Ved håndtering af prydplanter skal der anvendes kemisk bestandige handsker.

Der må ikke forekomme udledning af vand fra produktionen til miljøet eller til kloak.

Plantemateriale og dyrkningsmedie til bortskaffelse skal opbevares tildækket og på tæt belægning.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).

Må ikke tømmes i kloak afløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Ved indtagelse skal der ikke fremprovokeres opkastning. Søg straks lægehjælp og fremvis produktets etikette. Ved kontakt med hud eller hår fjernes eventuelt forurenede beklædningsdele og der skylles grundigt med rindende vand. Skrub ikke huden. Kommer væsken i øjnene skylles straks grundigt med vand.

fine

FINE AGROCHEMICALS LIMITED
HILL END HOUSE WHITTINGTON
WORCESTER WR5 2RQ UK
ENQUIRE@FINE.EU
WWW.FINE.EU

DISTRIBUERES AF

CILLUS

CILLUS A/S
TAASTRUP HØVEDGADE 121
2630 TAASTRUP
T.F. 44 91 60 55
WWW.CILLUS.DK

FABR. NR.: SE EMBALLAGE
UDLØBSDATO: 2 ÅR EFTER PRODUKTIONS DATO, SE EMBALLAGE
CONFIGURE® ER ET REGISTRERET EF-VAREMÆRKE AF
FINE AGROCHEMICALS LTD.
CFG/DK/5L/16F

NETTOINDHOLD:
5L

Productname	Configure		
Country	Denmark		
Package size	5 Litres		
Label code	CFG/DK/5L/16 - set	Name	Marco Pelkman
Label dimensions	130x150 (hwx)	Draft	Version 3
Label date	August 2016		

BRUGSANVISNING

VIGTIGT: Alle instruktioner i dette afsnit skal læses omhyggeligt for at opnå sikker og vellykket brug af dette produkt.

Afhængig af behandlingsmetoden vil Configure øge forgrening eller fremme blomstring i visse pryplanter.

Plantens reaktion på Configure er påvirkelig af kultur- og miljømæssige forhold. Vækstmedie, vand, temperatur, lys og andre kultur-mæssige foranstaltninger kan påvirke planternes respons. Plantestørrelse og art eller sort kan også påvirke planternes reaktion på behandlingen. Selvom flere sorter er testet for følsomhed og selektivitet overfor Configure og har vist en høj grad af tolerance, er det umuligt at garantere en acceptabel respons i alle sorter. Anvendelsen af Configure på en ny prydpilante eller en ny sort bør altid afprøves først på et begrænset antal planter for at bestemme afgrødens respons.

Configure bør kun anvendes på pryplanter dyrket i potter i lukkede væksthuse. Udsprøjt Configure som bladsprøjtning med anvendelse af standard sprøjteudstyr egnet til formålet. Udsprøjt Configure i en vandmængde på ca. 1000 l/ha med en ensartet sprøjteåge. Der skal udvises forsigtighed for at undgå afdrift til naboplanter. Udsprøjtning bør ske med lille dråbestørrelse. Langsom indtørring af sprøjtevæsken bør altid tilstræbes. Behandling når den relative fugtighed er høj øger gennemtrængeligheden af produktet i bladene.

Der behandles tidligst 3 uger efter potning, når planterne er aktivt voksende. Det bør sikres, at rødderne er veludviklede på tidspunktet for behandlingen.

Effekterne af Configure anvendt på planter til formering er ikke undersøgt.

Dosering og tidspunkt for sprøjtning:
(Følgende anvendelser af Configure er understøttet af data)

Afgrøde	Tidspunkt	Dosering
Orkidé (Phalaenopsis sp.)	Én uge efter kuldeinduktion	20 - 40 ml/l (max. 1 behandling).
Julekaktus/ helligdagskaktus (Schlumbergera sp.)	Første synlige knopper	5 - 10 ml/l (max. 1 behandling)
Husløg (Sempervivum)	Når planten har veletablerede rødder	40 ml/l (max. 1 behandling)

Orkidé (Phalaenopsis sp.)

For at øge antallet af blomsterstængler, anvendes Configure en uge efter starten af kuldeinduktionen med 20-40 l/ha.

Julekaktus og helligdagskaktus (Schlumbergera spp.)

For at øge antallet af blomsterknopper under reproduktive betingelser, anvendes Configure med 5-10 l/ha, når blomsterknopper bliver synlige.

Husløg (Sempervivum sp.)

For at øge forgrening anvendes Configure med 40 l/ha efter at rødder er veletablerede.

OPBLANDING

Tilføj den beregnede mængde Configure til den halvt fyldte sprøjtetank, mens der omrøres. Fyld tanken og fortsæt omrøring under sprøjtearbejdet. Brug sprøjteopløsningen indenfor 24 timer.

RENGØRING

Umiddelbart efter brug rengøres sprøjteudstyret grundigt. Fortynd den sprøjtevæske der er tilbage i tanken med mindst 10 dele rent vand og udsprøjt derefter på behandlede planter. Tanken skal derefter dobbelt skylles (ved tilsætning af vand indtil tanken er cirka 25% fuld og derefter udsprøjtning af denne opløsning på behandlede planter).

BLANDBARHED

Bland ikke Configure med andre vækstreguleringsmidler, pesticider eller gødningsmidler.

Midlet er skånsomt overfor populationer af *Typhlodromus pyri* og *Aphidius rhopalosiphii*. Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr er ukendt.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Producenten fratægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.