

Etiket nr.: 1

GODKENDT
af Miljøstyrelsen:
12. januar 2024

For pakning på:
20L

Fransiska Löfdal



CREDIT® XTREME



Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning jf. brugsanvisningen.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til:

Ukrudtsbekæmpelse før såning, herunder nedvisning af efterafgrøder, og efter såning men før fremspiring jf. brugsanvisningen.

I følgende foderafgrøder: raps, korn, ærter, bønner og græs, er det efter fremspiring kun tilladt at bekæmpe flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning på mindre områder af marken.

I følgende konsumafgrøder: konsumærter, kornsorter til malt, havre til gryn og brødkorn (rug, hvede, byg, triticale og spelt), er det efter fremspiring ikke tilladt at anvende plantebeskyttelsesmidler indeholdende glyphosat i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Raps og hør til frø, hvede, rug, triticale, byg, havre, ærter og bønner må ikke behandles senere end 10 dage før høst.

Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer indtil 30 dage før høst og om efteråret efter høst.

Ukrudtsbekæmpelse på stubmarker.

Omlægning af brak- og græsmarker.

Ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer.

Ukrudtsbekæmpelse på og omkring spor og skinner på jernbaner.

Ukrudtsbekæmpelse på udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.

Frugter, fra et areal, der er behandlet med glyphosat, må anvendes som foder til husdyr.

Afgrøder behandlet med glyphosat må ikke anvendes som foder til fjerkræ og får, da det vurderes, at restindhold i animalske produkter vil overskride grænseværdien.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra S3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater op til og inklusiv 3,63 L produkt/ha (SpE3).

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra S3-områder for at beskytte vilde planter ved applikationsrater over 3,63 L produkt/ha (SpE3).

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Må ikke tømmes i kloakfløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Ved indtagelse: Ved indtagelse, kontakt straks en læge og vis emballagen eller etiketten.

Øjenkontakt: Hold øjne åbne og skyl straks og længe med vand. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Hudkontakt: Vask straks med sæbe og store mængder vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

Indånding: Giv den berørte person mulighed for at indånde frisk luft.



UFI: FW6V-PHAK-WFAH-229M

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 347-43

Analyse ved 20 °C: Indeholder 540g glyphosat pr. liter (41,5 % w/w).

Midlet er et vandopløseligt koncentrat.

10 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalations toksicitet

Mindest holdbart i tre år efter produktionsdatoen.

Produktionsdato og batchnummer: se emballagen.

Opbevares frostfrit.

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmidler (forordningen 1107/2009).

20L

510010312_012024

Registreringshaver:
Nufarm Deutschland GmbH
Im Media Park 4e
50670 Köln, Tyskland
Tel: +492211791790



7 350147 461480

 **Nufarm**
Grow a better tomorrow

BRUGSANVISNING

Generelt om Credit Xtreme

- Credit Xtreme anvendes mod kvik og andre flerårige græsser samt bredbladet ukrudt i korn, græs, korsblomstrede afgrøder, ærter, hestebønner, stubmarker, frugtplantager, planteskoler, skovkulturer og på udyrkede arealer. Kan anvendes før såning/plantning.
- Credit Xtreme virker ved, at midlet optages gennem bladene og transporteres rundt i hele planten med saftstrømmen.
- Behandling med Credit Xtreme skal ske på tørre planter, som er i god vækst. Undgå at behandle, hvis der er udsigt til regn efterfølgende.
- For en god effekt på kvik kræves mindst 3-4 veludviklede friske blade.
- Under gunstige betingelser vil intervallet mellem sprøjtning og efterfølgende jordbehandling være følgende:

Ukrudtsplanter	Jordbehandlingsinterval
Frøukrudt samt spildkorn	6 timer efter behandling
Alm. kvik	2 dage efter behandling
Flerårige græsser	5 dage efter behandling

- Direkte såning kan udføres 2 dage efter behandling af kvik og allerede 1 dag efter behandling af frøukrudt eller spildkorn. Ved direkte såning i græsmarker skal plantemassen visne helt før såning.
- Ved nedbrydning af en stor mængde organisk materiale, f.eks. frøgræs eller kvik, kan der frigives spirehæmmende stoffer, som kan skade en efterfølgende afgrøde. En jordbehandling kan forhindre eller reducere problemet.
- For at begrænse risiciene for vandlevende organismer og planter udenfor det behandlede område henvises til vejledningen: "Brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler", udgivet af Miljøstyrelsen.

Før såning/plantning

Bekæmpelse af kvik

Lad marken være urørt indtil kvikken har mindst 3 nye blade. Andelen af fremspiede kvik er ofte mindre i foråret, så forvent ikke den samme virkning som i efteråret.

Jordbehandling, direkte såning: se **Generelt om Credit Xtreme**.

Dosering se **Doseringstabel**.

Bredbladet ukrudt

Behandling kan finde sted i begyndelsen af væksten, så snart vækstpunkterne grønnes. Jordbehandling, direkte såning: se **Generelt om Credit Xtreme**.

Dosering se **Doseringstabel**.

Efter såning/plantning – før fremspiring

Bekæmpelse af kvik, græsukrudt og bredbladet ukrudt udføres når marken grønnes og inden fremspiring af afgrøden.

Kartofler – undgå behandling efter lægning af forspiede kartofler og dyrkning af læggekartofler.

Dosering se **Doseringstabel**.

Bekæmpelse af flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning i korn, raps, bønner, ærter og græs

I frøafgrøder behandles, når vandindholdet i frøet er under 30 %.

I korn behandles, når kernerne er hårde og vanskelige at dele med en fingernegl.

Raps behandles når størsteparten af skulperne i rapsen er gulgrønne med gulbrune og enkelte sorte frø.

Bønner og ærter behandles når halvdelen af bælgene er fuldt modne.

Sprøjtetidspunktet vil indtræde 2-4 dage før normal skårlægning. Behandlede afgrøder høstes direkte mellem 14 og 21 dage efter sprøjtning, afhængig af vejrforholdene.

Må ikke behandles senere end 10 dage før høst. Ved pletsprøjtning forstås behandling med produktet på mindre områder af marken.

Afgrøder til udsæd må ikke behandles. Afgrøder til humant konsum må ikke behandles.

Dosering: se **Doseringstabel**.

Stubmarker

Bekæmpelse af kvik og andre ukrudtsarter i stub efter høst. Halmen bør fjernes eller snittes og fordeles jævnt, så kvik og andet ukrudt sikres en god genvækst. Kvikken skal have mindst 3-4 fuldtudviklede blade inden behandling.

Jordbehandling og direkte såning: se **Generelt om Credit Xtreme**

Dosering: se **Doseringstabel**.

Bekæmpelse af et- og flerårigt ukrudt. Der behandles på planter i god vækst. Kvik skal have udviklet 3-4 blade inden behandling, og andet flerårigt ukrudt skal have nedadgående saftstrøm.

Jordbehandling: se **Generelt om Credit Xtreme**

Omlægning af græsmarker

Bekæmpelse af kvik, andre ukrudtsarter og /eller omlægning af græsmark. Marken skal være fri for afgrøderester. Vent til der er god genvækst inden behandling (skal helst være 10 cm før der sprøjtes)

Jordbehandling og direkte såning: se **Generelt om Credit Xtreme**

Dosering: se **Doseringstabel**.

Brak

Dosering: se **Doseringstabel**

Ukrudtsbekæmpelse i frugtplantager

Der opnås bedst effekt ved behandling om foråret/forsommeren når ukrudtet er i god vækst. Anvend afskærmet sprøjtning og sørg for at kulturens grene eller blade ikke bliver ramt af sprøjtevæsken.

Alternativt kan anvendes rygssprøjte. 1 dl Credit Xtreme blandes med 9,9 liter vand. Blandingen rækker til behandling af et areal på 250 m², svarende til vandmængde på 400 liter pr. ha.

Dosering: se **Doseringstabel**

Skovplantage på landbrugsjord og skovplanteskoler

Bekæmpelse af uønskede små træer, græs og andet et- og flerårigt ukrudt. Ved bekæmpelse før plantning anvendes bredsprøjtning. Efter plantning skal anvendes afskærmet sprøjtning, så kulturen ikke rammes. Sprøjt på ukrudt i aktiv vækst og undgå at ramme eventuelle rodkud.

Dosering: se **Doseringstabel**.

Jernbane

Sprøjtebom monteret på sprøjtetog.

Dosering: se **Doseringstabel**

Udyrkede arealer, såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.

Bekæmpelse kan udføres med traktormonteret sprøjte. Der behandles på ukrudt i god vækst. Behandl ikke arealer med spiselige bær og svampe inden for det tilsigtede behandlingsområde.

Dosering: se **Doseringstabel**.

Optimale betingelser

For at opnå den bedste effekt med lavere doseringer kræves der optimale betingelser:

- Tørre planter
- Ukrudt i god vækst og med 3–4 grønne friske blade
- Ingen udsigt til regn (midlet er regnfast efter 1 timers tørvej)
- Høj luftfugtighed
- Dagtemperatur på 15 °C
- Sprøjtning først på dagen

Anvendelse og doseringstabel

Afgrøde / anvendelse	Maks. antal behandlinger pr. vækstår og maks. dosis (l produkt/ ha)	Instruktioner for behandling / Bemærkninger
Før såning / plantning af alle afgrøder	1 x 2,0	
Efter såning / plantning, før fremspiring af alle afgrøder	1 x 2,0	Før fremspiring. i kartofler, undgå behandling efter lægning af forspirede kartofler og i læggekartofler
Bekæmpelse af flerårigt ukrudt ved pletsprøjtning i korn, raps, bønner og ærter til foder.	1 x 2,0	Behandlingsfrist 10 dage før høst. Ved pletsprøjtning forstås behandling med produktet på mindre områder af marken.
Stubmark (efter høst i alle afgrøder)	1 x 4,0	
Brak	1 x 3,33	Der behandles på ukrudt i god vækst før såning (forår til efterår)
Omlægning af græsmark	1 x 2,67	Det behandlede græs må ikke anvendes til foder
Græs til slæt: Ukrudtsbekæmpelse ved pletsprøjtning	1 x 2,67	Pletsprøjtning til bekæmpelse af flerårigt ukrudt, f.eks. tidslær og skræpper.
Ukrudtsbekæmpelse mellem og under frugttræer: æbler, pærer, kirsebær og blommer	1 x 4,0	Der anvendes afskærmet sprøjtning, så kulturtræerne ikke rammes.
Skov før plantning på landbrugsjord	1 x 2,0	
Skov	1 x 2,0	Der behandles på ukrudt i god vækst i perioden maj-september. Der anvendes afskærmet sprøjtning, så kulturtræerne og evt. rodskud ikke rammes.
Skovplanteskole (Nåletræer og vedplanter)	1 x 4,0	Der behandles på ukrudt i god vækst. Afskærmet sprøjtning i rækkerne. Planterne skal være mindst 2 år gamle og rodfæstede på arealet.
Udyrkede arealer såfremt disse ikke er befæstede eller stærkt permeable.	1 x 2,0	Der behandles på ukrudt i god vækst.
Jernbaner	1 x 4,0	Der behandles på ukrudt i god vækst.

Sprøjteteknik

Generel vandmængde 150–200 l/ha, ved lavere doseringer (0,75–1,0 l/ha) max 150 l/ha.

Vandmængde ved brug af rygsprøjte 350–500 l/ha.

Det er vigtigt, at sprøjttevæsken fordeles jævnt i hele området. Undgå vinddrift til nærliggende afgrøder og læhegn, som kan blive skadet, hvis de kommer i kontakt med Credit Xtreme. Derfor, anbefales det at bruge lowdrift dyser eller evt. kompakte luftinjektionsdyser, som reducerer risikoen for adrift betydeligt.

Valg af dyse: f.eks. lowdrift Hardi ISO LD 02-110 eller ISO LD 03-110 eller tilsvarende kompakte luftinjektionsdyser, f.eks. Hardi minidrift (MD) dyser.

Generelt om resistens

Hos alle ukrudtsarter kan der være planter, der er naturligt mere tolerante eller resistente over for nogle sprøjtemidler, hvilket kan føre til dårlige resultater ved brug af disse produkter. Glyphosat tilhører Gruppe 9 baseret på HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klassifikation.

Der bør udarbejdes en strategi for at mindske udviklingen af resistens. Dette omfatter korrekt brug af pesticider, rotation af forskellige virkningsmekanismer, hvor det er muligt, og / eller brug af andre dyrkningsmetoder, f.eks. afgrøderotation og mekanisk bekæmpelse.

- Følg anbefalingerne på etiketten, især for at sikre, at behandlingen er udført på det korrekte tidspunkt, under passende betingelser og med den korrekte dosering.
- Minimer risikoen for spredning af ukrudt til nye arealer, f.eks. via rengøring af maskiner mv.
- Brug altid god sprøjteadfærd for at opnå effektiv ukrudtsbekæmpelse: Sprøjteudstyret skal inspiceres regelmæssigt (af autoriseret personale).
- Kalibrer sprøjten og brug den korrekte opblandede mængde for det område, der skal behandles.
- Brug den korrekte dyse for at maksimere afsætning på planter og minimere afdrift.
- Sprøjt kun under passende vejrforhold

Flere oplysninger er tilgængelige fra HRAC (<http://www.hracglobal.com/>), din forhandler/rådgiver eller fra din lokale repræsentant.

Rengøring af sprøjte

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktiver alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

1. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. Restsprøjtevæsken fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Vær opmærksom på, at den maksimalt tilladte dosering ikke må overskrides på markniveau.
2. Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet kan sprøjtes ud over den afgrøde, der netop er behandlet.
3. Fyld tanken med 10 - 15% af tankkapaciteten (100 - 150 l/1000 l tank) og tilsæt 0,5 l All Clear® Extra pr. 100 l vand. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet kan sprøjtes udover den afgrøde, der lige er behandlet.

4. Dyser, filtre og sier afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear® Extra pr. 10 liter vand. Dyser, filtre og sier monteres igen.

5. Sprøjten fyldes igen med 10 - 15% af tankkapaciteten. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser over et egnet areal.

Vask af marksprøjter og traktor, der har været anvendt til udbringning, skal ske på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller på det areal hvor Credit Xtreme er blevet udbragt. Et areal i marken, der anvendes til vask, må kun benyttes én gang inden for en vækstsæson.

Uvasket sprøjteudstyr eller traktor skal placeres på det behandlede areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag.

For yderligere regler vedrørende vaskeplads/rengøring af sprøjteudstyret henvises til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 eller eventuel senere udgave, samt den tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen.

Bortskaffelse

Midlet må kun opbevares i originalemballagen

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Mindre anvendelse af Credit Xtreme (347-43) til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i gul sennep og hør til frøproduktion. Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på afgrøder. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Ukrudtsmiddel:

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt og nedvisning før høst i gul sennep og hør til frøproduktion. Brugsanvisningens doseringsangivelser skal overholdes

Brugsanvisning for mindre anvendelse:

Afgrøde	Maks. antal behandlinger pr. vækstår og maks. dosering pr. behandling (l/ha)	Bemærkninger
Gul sennep til frøproduktion	1 x 2,0-2,33	10-14 dage før høst når afgrøden er nået vækststadiet 85-87 og frøet har mindre end 30 % vandindhold
Hør til frøproduktion	1 x 2,0-2,33	10-14 dage før høst når afgrøden er nået vækststadiet 85-87 og frøet har mindre end 30 % vandindhold