

# DLA Agro Cyazofamid

Svampemiddel. Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler.

## ADVARSEL

For at nedsette risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

**Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og ikke senere end 7 dage før høst.**

**Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.**

**Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (søer og vandløb m.m.).**

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

For at undgå udviklingen af resistens må dette produkt eller andre produkter som indeholder Cyazofamid kun anvendes 6 gange pr. sæson og maksimalt 3 gange i træk.

**Opbevares utilgængeligt for børn (S2).**

**Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13).**

Svampemiddel nr. 21 – 110

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

**Analyse:** Cyazofamid 400 g/l (35 %) Flydende

**Nettoindhold:** 1 liter.

## Førstehjælp

Er patienten bevidstløs skal denne hurtigst muligt under lægebehandling/på skadestue.


**Indånding:** Bring personen ud i frisk luft, sørg for at patienten kan trække været frit.

Hvis der er åndedrætsproblemer skal patienten konsultere en læge.

**Huden:** Kommer stoffet på huden, vask med vand. Fjern forurenede tøj. Forurenede tøj må ikke bruges igen, før det er vasket. Ved fortsatte irritationer skal læge konsulteres.

**Øjne:** Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter, hvis muligt brug en øjenskyller. Fjern evt. kontaktlinser. Der skal ikke bruges neutraliseringsmidler. Ved fortsat irritationer eller ubehag, konsulteres en læge.

**Indtagelse:** Opkastning skal undgås/Må ikke fremprovokeres. Hvis personen er ved bevidsthed skyl munden. For en sikkerheds skyld bør patienten konsultere en læge. Medbring etiketten eller sikkerhedsdatablad ved lægekontakt. En læge der behandler kan indhente mere information ved Giftlinjen på Bispebjerg Hospital tlf: 82 12 12 12.



## Brugsanvisning

**Anvendelse** DLA Agro Cyazofamid er et svampemiddel mod kartoffelskimmel. Det er et kontaktmiddel uden systemisk virkning, derfor skal midlet anvendes forebyggende. Sprøjt med et interval på 7 til 10 dage afhængigt af smittetrykket. Der opnås optimal effekt af produktet ved at blande det med følgende additiv. Additivet fordeler sprøjtevæsken på bladene optimalt og gør at midlet optages hurtigere og bedre i kartoffelplanten. DLA Agro Cyazofamid er regnfast når sprøjtevæsken er tørret ind på bladene.

**Behandlingsprogram og intervaller i kartofler.** Da kartoffelmarker i praksis behandles mod svampesygdomme mindst 5 gange i løbet af sæsonen, er det vigtigt at få lagt en plan for disse sygdomsbehandlinger. Det anbefales at veksle mellem midler med forskelligt aktivstof, - dels for at få en effektiv og dækkende sygdomsbekæmpelse og for at forebygge resistensdannelse.

Med hurtig tilvækst og stort smittetryk sprøjtes der med 7 dages interval, ved lavere smittetryk med op til 10 dages interval. Sprøjt 2 eller 3 gange med DLA Agro Cyazofamid i sidste halvdel af det planlagte sprøjteprogram, da DLA Agro Cyazofamid har en særlig god effekt mod knoldskimmel. DLA Agro Cyazofamid må maksimalt bruges 3 gange i træk og højst 6 gange i løbet af en sæson, - for at undgå resistensdannelse. Der må ikke sprøjtes senere end 7 dage før høst med DLA Agro Cyazofamid.

**Andre midler i planen:** Mancozeb (Dithane og Tridex) - Fluazinam (Ohayo og Shirlan) samt Azoxystrobin (Amistar) – sidstnævnte kun kartoffelbladplet. Den første behandling mod kartoffelskimmel foretages og vandingssystemerne melder om en situation, hvor faren for sygdomsangreb er stor, det er som regel når kartoffelrækkerne lukker. Sprøjtning på et tidligere tidspunkt kan være nødvendig ved stærkt smittetryk samt knoldsmitte.

**Dosering og sprøjte teknik.** Der skal bruges 0,2 l/ha DLA Agro Cyazofamid + 0,15 l/ha additiv i 200 – 400 liter vand pr. ha i almindelige sprøjter. Additivet tilsættes altid til sidst. Det er vigtigt at få hele planten dækket af sprøjtevæsken. DLA Agro Cyazofamid kan også anvendes i luftassisterede sprøjter.

Dyser:	Vand:	Tryk:	Hastighed:
ISO F LD 110-02	200 l/ha	5,0 bar	6,0 km/t
ISO F LD 110-03	300 l/ha	5,0 bar	6,0 km/t
ISO F LD 110-04	400 l/ha	5,0 bar	6,0 km/t

Andre tryk og dyser kan anvendes, se sprøjtes manual samt forskellige tabeller. Hvis der er fare for afdrift af sprøjtevæsken bruges LD (= Low Drift) dyser.

**Tilberedning af sprøjtevæsken.** For at undgå skumdannelse skal følgende procedure følges:

1. Fyld sprøjten med ca. 10 % af den beregnede mængde vand og tilsæt midlet.
2. Ved de efterfølgende påfyldninger tilsættes DLA Agro Cyazofamid før vandet.
3. Fyld sprøjten op til 90 % vandmængde.
4. Tilsæt den beregnede mængde additiv. Anvend tabellen for beregning:
5. Tilsæt den resterende mængde vand og start så omrøreren (på mindste styrke).
6. Tom emballage skylles med vand – skyllevandet hældes i sprøjtetanken.

Omrøreren skal køre under hele sprøjtningen.

7. Er der en mindre rest i tanken efter sprøjtningen, fortyndes denne

med vand og sprøjtes ud over det behandlede areal.

**Blanding med andre midler.** DLA Agro Cyazofamid kan blandes med mikronæringsstoffer, insekticider af typen pyrethroider og

herbicidet Rimsulfuron (Titus). Alle blandingsprodukter skal tilsættes inden additivet tilsættes.

**Rengøring af sprøjten.** Sprøjten skal rengøres grundigt efter brug. Af hensyn til vandmiljøet er det vigtigt, at rengøringen og udtømming af skyllevand foretages et sted, hvorfra der ikke kan udledes rester af sprøjtevæsken til søer, vandløb, brønde, dræn og eventuelle kloakker.

**Bortskaffelse af tom emballage.** Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation. Beholderen skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken når denne tilberedes.

**Omsåning, efterfølgende afgrøder.** Der er ingen begrænsninger i valg af følgende afgrøder i den behandlede mark.

**Opbevaring.** Tørt og frostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

**Vejtransport** UN Nr.:3082 ADR kl.:9 PG:III

**Importør:** DLA Agro – Centerhavnsvej 13 – 7000 Fredericia – Tlf. 79 21 21 21.

Etiket nr.: T  
GODKENDT

26 APR. 2007

for pakninger på: 1 liter  
Miljøstyrelsen