

DIFLANIL 500 SC

Krudtmiddel. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbý, vinterrug og tritcale samt i frugtplantager (æbler og pærer).

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Ukrudtmiddel nr. 601-1, Netto indhold: 1 Liter.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009
Aktivstof : 500 g/liter Diflufenican (43,5%w/w)
Virkningsklasse HARC gruppe F1
Midlet er et suspensionskoncentrat
Batchnummer: Se emballagen
Produktionsdato: Se emballagen
Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen

Registreringsindehaver:

Q-CHEM NV Leeuwerweg 138, 3803 Sint-Truiden, Belgien

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpilgigtte sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedestående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbý, vinterrug og tritcale og ikke senere end vækststadium 28.

Må yderligere anvendes til ukrudtsbekæmpelse i frugtplantager (æbler og pærer) med én behandling i perioden efter blomstring til midten af juli ved afskærmningssprøjtning.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ved doseringer op til 0,15 L/ha ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ved doseringer op til 0,25 L/ha ikke anvendes nærmere end 20 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ved doseringer op til 0,60 L/ha ikke anvendes nærmere end 40 m fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (Sp1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P103).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

ADVARSEL



BRUGSANVISNING

Anvendelse

Diflanil 500 SC er velegnet til bekæmpelse af efterårsfremspirede bredbladede ukrudtsarter i vinterrug samt visse ukrudtsarter i vårbý og vårhvede, desuden til ukrudtsbekæmpelse i frugtplantager (æbler og pærer).

Midlet må ikke anvendes senere end vækststadium 28. Produktet må kun anvendes i gang pr vækstar.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Diflanil 500 SC mod ukrudt i solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær, aronia og hyben

Etableringsårene

Diflanil 500 SC må anvendes i gang om foråret før knopbrydning eller i gang om efteråret efter høst. Ved forårsanvendelse må der ikke høstes/anvendes bær fra buskene (8 måneders sprøjtefrist). Der skal anvendes afskærmningssprøjtning

Høstårene

Diflanil 500 SC må anvendes i gang om efteråret efter høst og ikke senere end 6 måneder før høst. Der skal anvendes afskærmningssprøjtning

Anvendelsen i afgrøden sker på brugers eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige relevante bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Diflanil 500 SC i priklebede med planteskolekulturer

Anvendelsestidspunkt og vilkår:

Der foretages kun få afprøvninger med Diflufenican i planteskolekulturer, og der bør derfor altid foretages en prøvesprøjtning på et mindre areal først gang midlet anvendes i en ny kultur eller sort. Vejforholdene kan ligeledes have stor indflydelse på effekt og skade på kulturen.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugers eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige relevante bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Midlerne må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Dosering:

Doseringen må maksimalt udgøre 0,12 L middel/ha.

Dosering

Diflanil 500 SC anvendes i doseringer med 0,05 L/ha-0,25 L/ha. Bedst effekt opnås når ukrudtet er i god vækst.

Brugsanvisning

Afgrøde	Tidspunkt	Dosering
Vinterrhede, vinterbý, vinterrug og vinter tritcale	Efterår BBCH 00-12	0,06-0,12 L/ha
	Efterår BBCH 13-14	0,12-0,25 L/ha
Vårbý og vårhvede	Efterår eller forår BBCH 14-16	0,12-0,25 L/ha evt. i blanding med andre herbicider
	Forår BBCH 00-14	0,06-0,15 L/ha
	Forår BBCH 20-28	0,15 L/ha evt. i blanding med andre herbicider
Æble og pære plantager	Forår efter blomstring og frem til midten af juli.	0,6 L/ha

Virkemåde

Diflufenican optages af ukrudtets blade og virker ligeledes som kontaktmiddel. Ved udspøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra det optages under fremspringen af nyt ukrudt. Det kan give hvide pletter på afgrøden ved sen udspøjtning. .

Efterfølgende afgrøde

Ved såning af vinterraps efter en afgrøde der er behandlet med Diflanil om foråret, anbefales det at pløje inden såning. Ved eventuel omsåning om foråret af en afgrøde, der er behandlet med Diflanil om efteråret, kan alle landbrugsafgrøder sås efter pløjning. Korn kan sås efter en grundig harvning.

Klima, jordtype og jordfugtighed

Diflanil kan anvendes med til 2°C, når der er udsigt til stigende temperaturer. Behandl ikke efter nattofro, vent til planterne er saftspændte igen. På humusjorde kan effekten være begrænset. God jordfugtighed under og efter sprøjtningen øger effekten og langtidsvirkningen. Der bør ikke sprøjtes med udsigt til nattofro.

Blandinger

Diflanil 500 SC kan normalt blandes med de mest anvendte midler. Husk altid at læse etiketten på blandingspartnern. Overhold anførte doseringsvejledninger og begrænsninger

Sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen. Der anvendes vandmængder fra 150 til 240 liter per hektar.

ISO – Alm fladsprededyser eller lavdriftdyser ved 3 bar tryk og 6 km/t

Dyserestørrelse	Ydelse (L/minut)	Væskemængde L/ha
02	0,8	160
025	1,0	200
03	1,2	240

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldtudestyr: Restsprøjtetanken og skyllendeudsprøjtet skal rengøres på det behandlede areal uanset fyldtudestyr. Skyllendeudsprøjtet skal være så stort, at restsprøjtetanken kan fortyndes mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuleudstyr vaskes sprøjteudstyret straks efter endt sprøjtning med vand fra skyllendeudsprøjtet. Skyllendeudsprøjtet fordeles så indvendigt vask og udspøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

Skyllendeudsprøjtet på marken under kørsel.

Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion gennemskylling og rengøres systemet. Vaskevandet udspøjtet under kørsel på det behandlede areal

Udvendig: Rengøring af marksprøjtning og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamlings til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjtningen er monteret med udstyr hertil, samt skyllendeudsprøjtet er tilstrækkeligt. I øvrige henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14/12/2012.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpilgigtte sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Tilberedning af sprøjtetvæske

Fyld tanken halvt op med rent vand. Tilsæt Diflanil 500 SC og fyld resten af vandet i. Tilsæt eventuel tankblandingspartner. Sørg for god omrøring før og under sprøjtningen.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllendeudsprøjtet hældes op i sprøjtevæskene. Emballagen må ikke genbruges. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P50)

Bemærk.

Q-Chem NV fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og jordbundsforhold kan påvirke effekten.



Indhold:
1 liter e



DK