

Dimilin[®] 25WP

Insektmiddel. Må kun anvendes til bekæmpelse af flue- og myggelarver i champignonkulturer samt fluelarver i stalde, fjerkræhuse og minkfarme og på udendørs gødningsanlæg.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Megget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelle lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtredelse af nedenstående, særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af flue- og myggelarver i champignonkulturer samt fluelarver i stalde, fjerkræhuse og minkfarme og på udendørs gødningsanlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Fodertrug skal tildækkes og foder og malkeredskaber fjernes inden sprøjtningen.

Må i champignon ikke anvendes senere end 18 dage før høst.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fodevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Må ikke tømme i kloakloft.

BRUGSANVISNING

Dimilin anvendes til bekæmpelse af skadedyr i champignonkulturer samt til bekæmpelse af fluelarver i stalde, fjerkræhuse, minkfarme og på udendørs gødningsanlæg.

Virkemåde

Dimilin virker ved at hindre dannelse af kitin i larvernes hudskellet så larverne dør. Der er ingen virkning på udviklede insekter, hvorfor behandling skal foretages ved sværming og aglægning eller tidligt larvestadium for at sikre optimal bekæmpelse af skadedyr.

ANVENDELSE MOD SKADEDYR I CHAMPIGNONKULTURER

I champignonkulturer bekæmpes larver af champignonmyg med 4 g Dimilin pr. m² champignonbed. Der foretages udvanding af produktet i 1/4 l vand pr. m² ligo efter der er lagt dækjord på den plantede bed.

Etiket nr.:
GODKENDT

01 OKT. 2010

for pakninger på:
Miljøstyrelsen

500g

ANVENDELSE MOD FLUER

Dimilin anvendes til fluebekæmpelse i alle staldtyper samt på møddinger og andre steder hvor fluer opformerer.

Der er kun virkning på fluelarver, og det er derfor nødvendigt at behandle alle steder, hvor fluelarver findes. Präparatet virker ikke øjeblikkeligt dræbende, men hindrer larverne i at blive til fluer. Dimilin har virkning i 3-4 uger, hvorefter der skal behandles igen. Dimilin bekæmper også fluer som er resistente overfor andre fluemidler.

I bokse med dybstroelse behandles strøelsen 3-7 dage efter rensning med 4 g Dimilin i 1 liter vand pr. m² ved vanding eller sprøjtning. Det er vigtigt at behandle alle strøelse helt ud til yderkanter af bokse. Efter 3-4 uger behandles igen. I dybstroelsestalde med tunge dyr, som store kreaturer eller heste, er det muligt at begrænse behandlingen til de områder der ikke betrædes af dyrene. Der behandles i ca. 1 meters bredde langs kanter og andre steder, hvor gødningen ikke betrædes.

I båsstalder skal der påstødes, hvor der sa mles gødningsrester eller foderrester (særlig bag krybbekanter), behandles med 3 ugers interval.

I riste- og spaltetalde vil der på kanten af gødningskanalen være fluelarver, og disse kanter skal derfor behandles hver 3.-4. uge.

I svinestalde med fast guld behandles hver 3.-4. uge hele gulvfladen i såvel området med strøelsen som i rensegangen med 4 g Dimilin pr. m². Det er vigtigt at behandle omhyggeligt langs kanter af stierne.

I fjerkræhuse bekæmpes fluerne ved at behandle ansamlinger af gødning med 4 g Dimilin pr. m² hver 3.-4. uge.

Dimilin[®] 25WP

INDHOLD

Insektmiddel nr. 558-8.
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Diflubenzuron 25 %

Pulverprodukt

Batch nr: Se andet sted på emballagen.
Holdbar i mindst 2 år efter produktionsdato.

Registreringsindehaver:

Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd.



Distribution:
Nordisk Alkali
Middelbøvej 1
8960 Randers SØ
Tlf. 4649 1171
4649 1174
info@nordiskalkali.dk

500 g

Chemtura

TK-025-027-06 (10/99)

* Bøg, varemærke, Chemtura Corp.

I minkfarme (den lille stueflue) behandles den del af sandlaget under burene, hvor der kan forekomme foderrester og gødning. Der behandles med 3-4 ugers mellemrum startende medio maj, når fluerne formorer starter. Behandlingen i maj/juni forebygger årets kraftige, første opformering, og der følges op hen over sommeren. Behandlinger i efteråret (september) forebygger næste års flueproblemer. Anvend 4 g Dimilin i 1 liter vand pr. m².

På møddinger kan nyudført gødning behandles med 4 g Dimilin i 1-2 liter vand pr. m².

TILBEREDNING:

Den afvejede mængde Dimilin udrøres i en lille vandmængde til en vælling for den halvdelen i den 3/4 fyldte beholder, som fyldes helt op under omrøring.

OPBEVARING:

Dimilin opbevares tørt og køligt. Tåler frost.

BORTSKAFFELSE:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tømme beholdere kan bortskaffes med dagrenovation.

BEMÆRK:

Det kan ikke udelukkes at visse typer insekter kan udvikle resistens mod dette produkt. Da resistensudvikling ikke kan forudses, kan producenten ikke holdes ansvarlig for nogen form for skade afledt af nedsat effekt overfor resistente insekter. Hvis der bemærkes nedsat effekt, anbefales det at benytte alternative midler eller metoder.

Nordisk Alkali afgiver ingen garanti ved andet brug af produktet end det som angives på etiketten. Køberen eller brugerens ret til erstatning for skader fratages såfremt brugsanvisningen ikke følges. Erstatning i forbindelse med forsømmelighed er begrænset til direkte skader og kan ikke overlige produktets indkøbspris.

22/5-2010
GODKENDT

ÅRHUS UNIVERSITET

Inst. for Plantebetyttelse og Skadedyr