

**ADVARSEL**

Undgå kontakt med hud og øjne. I tilfælde af stof i øjnene, skyl straks grundigt med vand og søg evt. læge.

**Brugsanvisning:**

Dipel er et biologisk insekticid, der anvendes til bekæmpelse af sommerfuglelarver (Lepidoptera), der æder planter - f.eks. knoporme, kålorme, mælere, viklere eller møl - men ikke larver, der har gnavet sig ind i frugter eller planter.

Sprøjt så snart larverne ses. Larverne vil standse fødeoptagelsen i løbet af få timer og dø i løbet af nogle dage. Sprøjt i tørvejr, da regn og kunstig vanding vil skylle midlet af.

Sprøjtning i stærk solskin bør undgås, vent til sidst på dagen.

Sprøjtningen kan gentages 3-14 dage senere, hvis flere larver viser sig.

**Dosering:**

1-2 ltr. pr. ha. (10-20 ml. pr. 100 m<sup>2</sup>)

Brug stor væskemængde

Kålglørlarver 2,0 ltr. pr. ha. (20 ml. pr. 100 m<sup>2</sup>)

Frugttræer: 2,0 ltr. pr. ha. (~0,1 % styrke)

Frugtbusk: 1,2 ltr. pr. ha. (~0,1 % styrke)

Skove: 3,0 ltr. pr. ha. (~0,1 % styrke)

Ved sprøjtning af planter med vokslag på bladene (f.eks. kål) bør der tilsættes et

spede/kæbemiddel, for at væsken fordeles godt og bliver på bladene.

Ved sprøjtning af planter i væksthus anvendes det at prøvesprøjt nogle enkelte planter, når der skiftes fra en sort til en anden, eller hvis kulturforholdene ændres - inden hele partiet behandles.

Emballagen **omrydes grundigt**, inden det afmålte kvantum hældes i sprøjtevæsken under moderat omrøring.

@ Dipel er varemærke registreret af

**VALENT BIOSCIENCES**

A DIVISION OF EASTMAN CHEMICAL AND PHARMACEUTICALS, INC.

# Dipel® ES

## Biologisk insektmiddel til bekæmpelse af larver på planter

**Analyse:**

Bacillus thuringiensis var kurstaki 3,5%  
(17.600 int. enheder pr. ml.)  
Inaktive bærestoffer 96,5%

# CITLUS

CITLUS A/S · Taastrup Hovedgade 121 · 2630 Tåstrup · Tlf. 44 91 60 55

Fabr. nr.:

Indhold: **10** Liter

Sælgere påtager sig intet ansvar for tab eller skade, som følge af fejlagtig anvendelse, anvendelse udover det i brugsanvisningen eller anden anvisning angivne eller anvendelse under unormale kulturforhold.

Sælgere fraskriver sig under alle forhold ansvar for driftstab, avancerstab og andet indirekte tab. Iøvrigt henvises til bestemmelserne i salgs- og leveringsbetingelserne.

**Tom emballage:** Den tomme emballage skylles godt med vand. Skylllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Den rengjorte tomme emballage kan bortskaffes sammen med dagrenovationen. Evt. rest afleveres til den kommunale modtageordning.

**Behandlingsfrist:** INGEN. Dog vil det være uden mening at sprøjt umiddelbart før indhøstning, da larverne først dør nogle dage efter behandling.

**Bigtighed:** Bier på træk skades ikke af Dipel.

**Håndtering:** Brug ansigtskærm ved tilberedning og udsprøjtning af væsken. Hvis væsken kommer i øjnene skylles med vand. Vask altid hænderne og ansigtet efter endt sprøjtning. Planterne skal være tørre, inden håndtering påbegyndes.

**Opbevaring:** Opbevares utilgængeligt for børn. Bør ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt fødevarer. Hvis hele emballagens indhold ikke bruges straks efter åbning, skal emballagen lukkes omhyggeligt og opbevares på en tør og kølig plads. Uåbnede emballager er lagerfaste i mindst 2 år. Efter anbrud bør produktet anvendes snarest muligt (indenfor 2 måneder). Opbevares frostfrit. Må ikke stå i direkte sollys.