



MAKHTESHIM
A G A N
BENELUX & NORDIC

Duotril

400 EC

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs.



UKRUDTSMIDDEL

Deklaration: Ukrudtsmiddel, nr 396-43

Analyse: Bromoxynil..... 240 g/l (20,5%)

loxylinil 160 g/l (13,7%)

Som octansyre-ester. Indeholder Solventnaphtha (råolie) tung aromatisk.

Væske: nettoindhold 5 L

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse

R36/38 Irriterer øjnene og huden

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse

R67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovlige leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs. Må i korn ikke behandles senere end i vækststadiet 31 og i frøgræs ikke senere end 90 dage for høst.

Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Godkendelsesindehaver:

Makhteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

www.mabeno.com

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via drænen fra gårdspladser og veje.

Må ikke tømmes i kloakaflob.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Tom emballage må ikke genanvendes.

FØRSTEHJÆLP

Indånding : Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

Huden : Fjern forurenet tøj. Skyl derefter huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.

Øjnene : Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i mindst 15 min. Kontakt læge.

Indtagelse : Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.

Medbring brugsanvisningen ved lægekontakt.



UN 1993



DENMARK



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

T422B/01

DUOTRIL 400 EC

Brugsanvisning:

Duotril 400 EC er et kontaktmiddel som anvendes til bekæmpelse af ukrudt om efteråret samt foråret i vinter- og vårsæd. Endvidere kan Duotril 400 EC anvendes i det tidlige forår i frøgræsmarker og frøgræs udlagt i renbestand, når græsset har 1½-2 blade. Udlægsmarker med lucerne, sneglebælg, hvid- og rødkløver samt frøer kan ligeledes behandles med Duotril 400 EC. Behandling af marker med udlæg skal ske umiddelbart efter, tokimbladet udlæg er sået. Duotril 400 EC optages af ukrudtets blade og virker som et kontaktmiddel. Duotril 400 EC er esterformuleret og giver derfor en god bekæmpelse af ukrudtet selv i kølige perioder og i perioder med lav luftfugtighed.

Anvendelse:

Korn:

Duotril 400 EC kan anvendes i vårsæd i st. 13-31. I vintersæd kan Duotril 400 EC anvendes i efteråret fra st. 11, og i foråret så snart ukrudtet er saftspændt, og væksten er begyndt og frem til st. 31.

Frøgræsmarker:

Der behandles om foråret, så snart væksten er startet og ukrudtet er småt. Ved forekomst af burrenørre, pileurt eller hanekro med max. 4 løvblade tilsættes 0,6 l Tomahawk 180 EC/Starane 180.

Frøgræs udlagt i renbestand om efteråret:

Der behandles med Duotril 400 EC når græsset er i st. 11-12 (1½-2 blade). For at få en bredere effekt og virkning på flere ukrudtsarter kan der i rajgræsser iblandes Express ST.

Dosering:

Duotril 400 EC anvendes med 0,2-0,6 l/ha. Mindste dosering i tankblanding med andre ukrudtsmidler. Den maksimale tilladte dosering i vintersæd om efteråret er 0,5 L/ha.

Rengøring af sprøjteudstyr:

Der skal anvendes spuledyse ved den indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på det behandlede areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjten fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimale tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Der bør anvendes et amoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.

Ukrudtsproblem	Ukrudt op til 2 løvblade	Ukrudt 3 – 4 blade
Duotril 400 EC 0,6 l/ha	Forglemmigej, mark Gåsefod, hvidmelet Hyrdetaske Pengeurt Pileurt, Sennep, ager Tvetand Kamille, lugtløs Kamille, skive Fuglegræs Kornblomst Limurt, nat Valmue, korn Evighedsblomst, sump Kål, ager Ærenpris, Kløver, hvid Raps Storkenæb Haremad Gåsemad	Forglemmigej, mark Gåsefod, hvidmelet Hyrdetaske Pengeurt Pileurt, Sennep, ager Tvetand Kamille Fuglegræs Limurt, nat Valmue, korn Evighedsblomst, sump Ærenpris

Tabellen angiver, hvilke ukrudtsarter der kan forventes mere end 85 % effekt på i en veludviklet afgrøde.

For at opnå tilstrækkelig effekt mod ukrudtsarter som ikke fremgår af tabellen skal der tankblandes med andre ukrudtsmidler som, Ally®, Nicanor®, Express®, Harmony® Plus, Tomahawk®, Legacy, Activus® WG, Stomp®, Boxer®. Undersøg mulighederne i Planteværn online eller kontakt din rådgiver for yderligere information.

Vejrforhold:

Duotril 400 EC kan anvendes fra ukrudtet er i vækst, men effekten opnåes også ved temperature ned til 2°C, blot der er udsigt til stigende temperatur. Ved udsigt til nattefrost bør behandling undlades. Efter en periode med frost, bør der først behandles når planterne er saftspændte. En høj luftfugtighed vil sikre en optimal plantevækst og dermed også en hurtigere effekt. Selv ved en relativ lav luftfugtighed vil effekten dog komme, men der må påregnes lidt længere tid inden virkningen indtræder. Jordfugten har ingen betydning for virkningen af Duotril 400 EC. Duotril 400 EC kræver 1 times tørvej efter behandlingen.

Jordtype:

Duotril 400 EC kan anvendes på alle jordtyper.

Duotril EC udsprøjtes på saftspændte ukrudtsplanter. Duotril EC udsprøjtes i min. 150 ltr. Vand pr. Ha. Anvend fladsprededyse, f.eks. Hardi ISO F 02-110 med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-Drift dyse. Ved forekomst af store ukrudtsplanter med et kraftig vokslag, som f.eks. spildraps, agersennep og haremad, anvendes dyser med mindre dråbestørrelse, eller trykket øges til 4 bar. Dette vil give en bedre dækning og forhindre sprøjtedråberne i at løbe af ukrudtsplanterne. Vær opmærksom på vinddrift, især når der sprøjtes nær vandmiljøer. Anvend LowDrift dyser.

Tilberedning:

Fyld beholderen med vand, omrøringen sættes i gang og den afmålte Duotril 400 EC mængde tilsættes. Eventuel blandingspartner tilsættes og der fyldes helt op med vand. Omrøringen forsættes under kørsel og udsprøjtning.

Tankblandinger:

Duotril 400 Ec kan blandes med Activus® WG, Ally® ST, Boxer®, Cycocel®, Express® ST, Harmony® Plus, Nicanor® 20 SG, Primera® Super, Starane® 180 S, Stomp® SC, Tern®, Tomahawk® 180 EC, Zenit®.

2

3

® Registrerede varemærker:

Activus® - Feinchemie Schwebda GmbH
Ally®, Express®, Harmony® - E.I. du Pont de Nemours & Company
Boxer® - Syngenta Ltd.
Primera® - Bayer Cropscience
Starane® - Dow AgroSciences LLC
Stomp® SC, Cycocel® - BASF Agro B.V.
Tomahawk® 180 EC - Agan Chemical Manufacturers Ltd.
Tern®, Zenit® - Syngenta Participations AG

Bortskaffelse:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme og rengjorte beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken

Resistensdannelse:

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i udvikling af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

Produktansvar:

Informationen om produktets anvendelse er baseret på producentens seneste erfaringer, og forstås derfor alene som anbefalinger. Mange faktorer såsom vejrforhold, jordtyper, sorter, resistens, sprøjteteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets effekt. Makhteshim-Agan påtager sig intet ansvar for følgerne af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af produktet og/eller af anvendelse af produktet i strid med medfølgende instruktioner, ligesom Makhteshim-Agan ikke påtager sig ansvaret for indirekte tab herunder avancetab og lignende. Ved tvivlsspørgsmål bedes De rette henvendelse til Deres leverandør.

DUOTRIL 400 EC

Brugsanvisning:

Duotril 400 EC er et kontaktmiddel som anvendes til bekæmpelse af ukrudt om efteråret samt foråret i vinter- og vårsæd. Endvidere kan Duotril 400 EC anvendes i det tidlige forår i frøgræsmarker og frøgræs udlagt i renbestand, når græsset har 1½-2 blade. Udlægsmarker med lucerne, sneglebælg, hvid- og rødkløver samt frøroer kan ligeledes behandles med Duotril 400 EC. Behandling af marker med udlæg skal ske umiddelbart efter, tokimbladet udlæg er sået. Duotril 400 EC optages af ukrudtets blade og virker som et kontaktmiddel. Duotril 400 EC er esterformuleret og giver derfor en god bekæmpelse af ukrudtet selv i kølige perioder og i perioder med lav luftfugtighed.

Anvendelse:

Korn:
Duotril 400 EC kan anvendes i vårsæd i st. 13-31. I vintersæd kan Duotril 400 EC anvendes i efteråret fra st. 11, og i foråret så snart ukrudtet er saftspændt, og væksten er begyndt og frem til st. 31.

Frøgræsmarker:
Der behandles om foråret, så snart væksten er startet og ukrudtet er småt. Ved forekomst af burrenerre, pileurt eller hanekro med max. 4 løvblade tilsættes 0,6 l Tomahawk 180 EC/Starane 180

Frøgræs udlagt i renbestand om efteråret:
Der behandles med Duotril 400 EC når græsset er i st. 11-12 (1½-2 blade). For at få en bredere effekt og virkning på flere ukrudtsarter kan der i rajgræsser iblandes Express.

Dosering:

Duotril 400 EC anvendes med 0,2-0,6 l/ha. Mindste dosering i tankblanding med andre ukrudtsmidler. Den maksimale tilladte dosering i vintersæd om efteråret er 0,5 L/ha.

Rengøring af sprøjteudstyr:

Der skal anvendes spuledyse ved den indvendige vask af sprøjten. Uvasket sprøjte eller traktor, der er anvendt til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal placeres på det behandlede areal, vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder, eller under tag. Restsprøjtevæsken skal i forbindelse med indvendig vask af sprøjten fortyndes mindst 50 gange og udsprøjtes på det behandlede areal under kørsel. Den maksimale tilladte dosering, som er anført på etiketten af de anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Der bør anvendes et amoniumbaseret rengøringsmiddel f.eks. All Clear Extra.



SA222A/01

agan: color:

4

1




MAKHTESHIM
A G A N
BENEUX & NORDIC

Duotril

400 EC

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs.



UKRUDTSMIDDEL

Deklaration: Ukrudtsmiddel, nr 396-43

Analyse: Bromoxynil.....240 g/l (20,5%)

loxynil.....160 g/l (13,7%)

Som octansyre-ester. Indeholder Solventnaphtha (råolie) tung aromatisk.

Væske: nettoindhold **4 x 5 L**

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

R20/22 Farlig ved indånding og ved indtagelse

R36/38 Irriterer øjnene og huden

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R63 Mulighed for skade på barnet under graviditeten

R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse

R67 Dampene kan give sløvhed og svimmelhed

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Undgå indånding af aerosoltåger.

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Vask huden efter arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige

leverandørbrugsanvisning samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs. Må i korn ikke behandles senere end i vækststadium 31 og i frøgræs ikke senere end 90 dage før høst.

Må ikke anvendes i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Godkendelsesindehaver:

Makhteshim - Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87,

NL-3832 GK Leusden, Holland

www.mabeno.com

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Må ikke tommes i kloakløb.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Tom emballage må ikke genanvendes.

FØRSTEHJÆLP

Indånding : Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefindende.

Huden : Fjern forurenet tøj. Skyl derefter huden med rigeligt vand efterfulgt af sæbevask.

Øjnene : Skyl straks med rigeligt vand og fortsæt i mindst 15 min. Kontakt læge.

Indtagelse : Fremkald ikke opkastning. Drik rigeligt vand og kontakt straks læge.

Medbring brugsanvisningen ved lægekontakt.

UN 1993



UN 1993



DENMARK



Sundhedsskadelig



Miljøfarlig

T4422C/01