

Ethofol 500 SC

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs-mæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

EUH401 Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H411 Giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

P261 Undgå indånding af spray.

P280 Bær beskyttelseshandsker.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovplichtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer hvert 3. år med en maksimal dosering på 71 g/ha ethofumesat.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes senere end 60 dage før høst.

SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjtudstyr nær overfladevand.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.

P362+P364 Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12



Etikette nr: VI
GODKENDT

18. september 2015

for pakninger på 1 L &
Miljøstyrelsen 12x1 L

Syrene Agreus

Ukrudtsmiddel nr. 14-178

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Suspensionskoncentrat (SC)

Indeholder: ethofumesate 500 g/l (44,3% w/w)

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 1 L



Producent/Registreringsindehaver:
AgroDan A/S
c/o UPL Europe Ltd
Ramskovvej 11, DK-7550 Sørvad
Tel. +45 76 66 03 00



5 711445 000214

ETH/DK/1L/F/0915/SwD

09/15DK 10002/20002

BRUGSANVISNING

Ethofol 500 SC anvendes til bekæmpelse af frøkrudt i bederoer.

Ethofol 500 SC har både blad og jordvirkning. Midlet virker vækststandsende på ukrudtet. Sammen med Betasana 2000 og Metafol 700 SC opnås en særdeles bred og effektiv ukrudtsbekæmpelse.

Ethofol 500 SC anvendes efter roernes fremspiring. Midlet kan forstærke effekten på burresnerre, fuglegræs, pileurter. Ethofol anvendes altid i blanding med andre midler.

Effekten på kamille, liden nælde og sort natskygge er begrænset, og rodkrudt som f.eks. kvik og tidsel bekæmpes ikke.

Forslag til renholdessystemer med Ethofol 500 SC:

Såfremt der sprøjtes meget tidligt i ukrudtets udvikling, og der er gode sprøjtebetingelser, kan de højeste doseringer af Betasana 2000 reduceres lidt.

Lille til almindelig ukrudtsmængde - ingen dominerende

1. behandling første ukrudt på kimbladstadiet	1,5-2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol 700 SC + olie
2. behandling 6-8 dage efter 1. sprøjtning	1,5-2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter Ethofol SC + olie
3. behandling 1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved nyfrespiring	1,5-2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter Ethofol SC + olie

Almindelig til stor ukrudtsmængde

- korsblomsret ukrudt, pileurt, burresnerre, storkenab evt. hundepersille

1. behandling første ukrudt på kimbladstadiet	1,5-2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol 700 SC + olie
2. behandling 6-8 dage efter 1. sprøjtning	2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter Ethofol SC + 10 g Safari + olie
3. behandling 1-2 uger efter 2. sprøjtning eller ved nyfrespiring	2,0 liter Betasana 2000 + 1,0 liter Metafol SC + 0,07 liter Ethofol SC + 10 g Safari + olie

NB: Betasana 2000-indhold: 160 g phenmedipham/liter.

Metafol 700 SC-indhold: 700 g metatiron/liter.

Ethofol 500 SC må kun anvendes med 0,14 liter pr. ha hvert 3. år.

Vær opmærksom på, at der er mængdemæssige restriktioner for brugen af Betasana 2000, Metafol 700 SC og Safari.

Olietil sætning

Til sætning af olie øger sikkerheden for god virkning af ukrudtsmidlerne. Doseringen afhænger under normale forhold af temperaturen:

Under 15°C	0,5-0,7 liter penetreringsolie pr. ha
15-20°C	0,2-0,5 liter penetreringsolie pr. ha
20-25°C	0,2-0,4 liter penetreringsolie pr. ha
Over 25°C	undlades normalt olietil sætning

Hvis planterne har udviklet et kraftigt vokslag, f.eks. efter flere dage med høje temperaturer og blæst uden nedbør, anbefales uafhængigt af temperaturen til sætning af 0,5-0,7 liter penetreringsolie pr. ha.

Sprøjteteknik: Ved bredsprøjtning anbefales en vandmængde på ca. 200 liter vand pr. ha.

Dysevalg f.eks.: Hardi 4210-14, ISO-F-02-110 eller LD-025-110. Ved udspøjtning sammen med Metafol 700 SC - se Metafol-etiket.

Vejrforhold: Ethofol 500 SC og tankblandinger hvorimod indgår, virker bedst på saftspændte, men tørre planter under gode vækstforhold.

Tankblandinger med Betasana 2000 udsprøjttes under kølige vejrforhold først på dagen. I perioder med varmt og solrigt vejr sprøjtes sidst på dagen.

I perioder med store temperaturforskelle mellem dag og nat, f.eks. varme dage efterfulgt af lave temperaturer, evt. natterfrost, frarådes sprøjtning.

Afstand til andre behandlinger: Det anbefales, at der er en egens afstand til andre sprøjtninger. Evt. kvikbekæmpelse med Agil bør først udføres, når kvikken er fri for eventuelle svindinger efter sprøjtning med Ethofol SC.

Omsåning: Ved anvendelse i et sprøjteprogram med Metafol 700 SC - se Metafol-etiketten.

Tilberedning af sprøjtevæsken: Sprøjtebeholderen fyldes halvt med vand, hvorefter Metafol 700 SC tilsættes gennem siden. Husk omrøring. Når Metafol 700 SC er fuldt fortøjet tilsættes Betasana 2000 og Ethofol 500 SC. Penetreringsolien tilsættes herefter.

Sørg altid for at sprøjtningen er korrekt rengjort samt efterset for blæselag inden tilberedning af sprøjtevæsken begynder. Dette gælder især hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Præparatlydeudstyr: Ved anvendelse af præparatlydeudstyr og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjteanken. Efterfølgende skylles præparatlydeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åben/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Ethofol 500 SC i fyldestationen.

Additiver/penetreringsolier tilsættes til sidst inden den endelige tankblanding er udført.

Direkte injektion: Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slager, som fører fra sprøjtes tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskyldning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Rengøring af sprøjteudstyr: Indvendig rengøring for marksprøjtter med præparatlydeudstyr: Restsprøjtevæsken og skylevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det behandlede areal uanset fyldestation. Skylevandstankens kapacitet skal være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledeyr vaskes sprøjtekanen straks efter endt sprøjtning med vand fra skylletanken. Skylevandet fordeles så indvendig vask og udspøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den krævede fortyndingsgrad.

2. Skylevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for Direkte injektion.

Udvendig rengøring af sprøjteudstyr: Rengøring af marksprøjtter og traktor skal ske på det behandlede areal eller på en vaskeplads med opsamlung til gyllebeholder eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjtter er monteret med udstyr hertil, samt at skylevandskapaciteten er tilstrækkelig.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1598 af 18. december 2014.

Bemærk: Blandinger med Ethofol 500 SC, Betasana 2000 og Metafol 700 SC er normalt skarsomme overfor roer, der er sunde og i normal vækst. Ved behandling under afvigende vejr- og vækstforhold kan der opstå forbigående vækstdepressioner.

Blandinger: Udover de i sprøjteplanen nævnte blandinger kan Ethofol 500 SC blandes med Cypermetrin og Pirimor G. Det frarådes, at blanding med midler der kan indeholde organiske opløsningsmidler.

Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovningen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skylevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke bruges.

Opbevaring: Frostit. Omrystes før brug.

Ansvarsklausul: Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.