



Vækstreguleringsmiddel
Må kun anvendes til behandling af ethylen-følsomme pryddplanter (potteplanter og afskårne blomster) i lukkede rum, inklusive lukkede lastbil rum.

Ethylbloc-Tabs

Vækstreguleringsmiddel

Vækstreguleringsmiddel nr. 624-2

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordning 1107/2009

Analyse: 6,3 g/kg (0,63% w/w) 1-methylcyclopropen

Nettoindhold: 12,5 gr (10 x 1 tabletter svarende til 1,25 gr)

Produktionsdato: 28/04/2010, mindst holdbar til 27/04/2013

Batchnummer: 0005234077

Registreringsindehaver

Rohm and Hass Europe Trading ApS

Division AgroFresh

23, avenue Jules Rimet

93631 La Plaine Saint Denis Cédex

Frankrig

Nødtelefonnr: +31 115 694 982

Distribution, salg og rådgivning

SiLa Plantebeskyttelse ApS

Kulsviervej 35,

3400 Hillerød

Telefon: 29 26 03 71 el. 29 26 03 67

hs@silaps.dk, jil@silaps.dk

Etikette nr.: I
GODKENDT

09 JAN. 2013

for pakninger på 10 tabletter
Miljøstyrelsen

Forsigtig

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje

Undgå indånding af gas.

Under behandling og indtil udluftning er tilendebragt skal der ved ethvert ophold i behandlingsområdet bruges åndedrætsværn (halv- eller helmaske) med filter A1P2.

De behandlede rum ventileres grundigt i mindst 15 minutter, før man går ind i dem.

I forbindelse med behandling i lastbil rum skal der påsættes et tydeligt skilt udenpå indgangen til rummet med følgende tekst: "Skal ventileres mindst 15 minutter før åbning grundet indåndingsrisiko"

Emballagen må ikke genbruges.

Vask alle personlige værnemidler efter brug.

Arbejdsgiveren har pligt til at instruere medarbejderne i arbejdet, så det foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, det gælder både de personer, der udfører behandlingen samt lastbilchauffører, der kører med de behandlede planter.

Arbejdsgiveren skal instruere ansatte, herunder chauffører, i hvordan åndedrætsværn anvendes og vedligeholdes korrekt.

Vær endvidere opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelle lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Vask huden efter arbejdet.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til behandling af ethylen-følsomme pryddplanter (potteplanter og afskårne blomster)

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp

Generel anvisning: Aftag forurenede beklædning

Indånding: Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag

Hudkontakt: Vask huden grundigt med rent vand og sæbe. Kontakt læge hvis irritationen ikke forsvinder.

Øjnkontakt: Fjern evt. kontaktlinser, åben øjet og skyl grundigt med rent vand.

Gå til kontrol hos øjenlæge.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning.

Søg lægehjælp og medbring etiketten.

Generelt

Virkemåde

Ethylbloc-Tabs anvendes for, at modvirke den negative effekt ethylen har over for ethylenfølsomme planter eller afskårne blomster.

Den positive virkning af behandlingen vil føre til **flere udsprungne blomster, en længere holdbarhed, færre blomster- og eller knop-fald, færre blade der bliver gule og færre blade der tabes, og endeligt vil behandlingen forlænge afskårne blomsters holdbarhed.**

Behandlingen udføres i rum der kan lukkes helt lufttætte og som er forsynet med automatisk udluftning.

B. Brugsanvisning

Ethylbloc-Tabs anvendes sammen med Aktivator tabletter fra Aktivator Kit. Ethylbloc-Tabs er grønne tabletter der, når de blandes med de blå Aktivator Tabletter og derefter overføres til Aktivator opløsningen vil frigive den aktive luftart 1-methylcyclopropene.

Anvendelse

-Ethylenfølsomme planter eller afskårne blomster: Som beskyttelse mod ethylen skader så som tab af blomster, gule- og visne blade.

Dosering: 1 Grøn tablet pr. 10 m³

De planter eller afskårne blomster der skal behandles bør behandles umiddelbart efter planterne er blevet høstet.

Behandling med Ethylbloc-Tabs skal udføres i et lufttæt rum, og behandlingen skal udføres i en periode på minimum 4 timer. Under behandlingen skal rummet forblive lukket. En gentagelse af behandlingen kan være fordelagtig for at sikre en længere opbevaringsperiode i henhold til markedets behov.

Behandlingsmåde

De rum eller containere der skal anvendes til Ethylbloc-Tabs behandling skal være lufttætte og være udstyret med en intern ventilator, der er i stand til at blande/sirkulere luften. Før behandlingen gennemføres, skal man være sikker på, at rummet hurtigt kan lukkes helt tæt, uden revner og sprækker. Den interne ventilator skal være tændt medens skrubbere og/eller ozon generatorer skal være afbrudte.

Derefter følg nedenstående instruktion:

- Åben den pakning der indeholder Aktivator Kit
- Lad beholderen med Aktivator opløsningen forblive i (skumgummiblokken) papkartonen. Fjern låget fra beholderen. Check at låget har et lille ventilations hul der er åbent.
- Fjern de to blå Aktivator tabletter fra (skumgummiblokken) papkartonen.
- Placer de to blå Aktivator tabletter i det afskruede låg. Brug altid to blå Aktivator tabletter.
- Tag det beregnede antal **grønne Ethylbloc-Taps** fra blisterpakningen **Anvend 1 grøn tablet for hver 10 m³ behandlings rum.**

For rum der er mindre end 100 m³ skal decimaler der er under 5 rundes ned, og en decimaler der er over 5 skal tilsvarende rundes op. Eksempel hvis det beregnede antal tabletter er 3,4 skal antallet rundes ned til 3 tabletter, er det beregnede antal tabletter 3,5 skal antallet rundes op til 4 tabletter.

For rum der er større end 100 m³ skal alle decimaler altid rundes ned.

- Placer de grønne tabletter sammen med de **blå** tabletter i det afskruede låg.
- Fjern folieforseglingen fra beholderen med Aktivator opløsningen, vær omhyggelig med ikke at spilde noget af Aktivator opløsningen.
- Overfør både de blå Aktivator tabletter og de grønne Ethylbloc-Taps til Aktivator opløsningen.
- Skrul låget fast på Aktivator beholderen.
- Placer Aktivator beholderen (i (skumgummi blokken) papkartonen) på et stabiltog vandret sted i rummet, eksempelvis på gulvet.
- Luk døren inden for to minutter og hold døren lukket i mindst 4 timer. **Brug nødvendige forholdsregler for at undgå, at behandlingsrummet bliver åbnet før behandlingstiden på de 4 timer er overstået.**
- Den interne ventilator skal være tilsluttet for at sikre en god luftcirkulation. Alle skrubbere (CO₂ og ethylen) skal være afbrudte. Brug af kalk for at fjerne CO₂ har ingen indflydelse på behandlingen.

Advarsel

Brug aldrig mere end 10 grønne Ethylbloc-Tabs pr. Aktivator Kit. Hvis der er behov for mere end 10 grønne Ethylbloc-Tabs, skal tabletterne fordeles i 2 eller flere Aktivator Kit. Hvert Kit kan højst aktivere op til 10 Ethylbloc-Tabs. **Når der anvendes mere end et Aktivator Kit, skal alle Kit gøres klare til anvendelse samtidig (trin a til g) før tabletterne overføres til Aktivator opløsningerne (trin h).**

Når behandlingsperioden er overstået skal behandlingsrummet grundigt udluftes. Alle ventilatorer skal køre på højeste niveau i mindst 15 minutter før personer må gå ind i rummet.

MAN SKAL HOLDE SIG VÆK FRA RUMMET UNDER UDLUFTNINGEN.

Bortskaffelse af tømt emballage og rester:

Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovation.

Produktansvar.

Produktansvar: Producenten påtager sig ikke noget ansvar for følgerne af forkert anvendelse af produktet i strid med de angivne instruktioner.